

Bobotic 20 mg x 50 kaps twist-off

Cena: 20,40 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	50 kaps.
Postać	kaps.twist-off
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

Opis produktu

Opis

Bobotic , krople, 30ml

wyrób medyczny

krople doustne

1 ml płynu zawiera 135 mg symetykonu

dla niemowląt od 28 dnia życia i dzieci do 12 lat

zapach malinowy

Wskazania

Wyrób medyczny Bobotic przeznaczony jest do stosowania u niemowląt od 28 dnia życia i dzieci do 12 lat w celu łagodzenia objawów, takich, jak kolka, wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie, niestrawność, związanych z nagromadzeniem gazu w obrębie przewodu pokarmowego.

Pomocniczo w przygotowaniu niemowląt od 28 dnia życia i dzieci do 12 lat do badań diagnostycznych jamy brzusznej, takich jak badania radiologiczne i ultrasonograficzne oraz wzernikowanie żołądka i dwunastnicy.

Działanie

- obniża napięcie powierzchniowe ścian pęcherzyków gazu znajdujących się w jelitach, ułatwia ich łączenie i pękanie, usprawnia to wydalanie gazów i zmniejsza napięcie jelit, które jest przyczyną bólu,
- zawiera symetykon, który po podaniu doustnym nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest całkowicie wydalany z kałem w postaci niezmienionej.

Skład

Symetykon, sodu benzoesan, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa, guma ksantanowa, aromat malinowy, woda oczyszczona.

Wyrób medyczny nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Sposób użycia

Bobotic należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Przed użyciem należy wstrząsnąć buteleczką do uzyskania jednolitego płynu. Butelka wyposażona jest w kroplomierz, za pomocą którego należy odliczyć zalecaną ilość kropli, które można podać do buzi dziecka przy pomocy dołączonej do opakowania łyżeczki lub nakroplic na smoczek przed podaniem go dziecku. Odmierzoną ilość płynu można wymieszać z niewielką ilością przegotowanej, ostudzonej wody, stosowanej żywności (mleka) lub innego niegazowanego płynu.

- Sposób użycia wyrobu w celu łagodzenia objawów takich jak: kolka, wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie, niestrawność oraz innych objawów związanych z nagromadzeniem gazu w obrębie przewodu pokarmowego:

- **Niemowleta (od 28 dnia życia) i dzieci do 2 lat:** 3 krople (20 mg symetykonu) przed, w trakcie lub po każdym posiłku. Nie należy przyjmować więcej niż 18 kropli na dobę (120 mg symetykonu).

- **Dzieci w wieku od 2 do 12 lat:** 6 kropli (40 mg symetykonu) przed, w trakcie lub po każdym posiłku. Nie należy przyjmować więcej niż 36 kropli na dobę (240 mg symetykonu). Podawana ilość może być modyfikowana zgodnie ze wskazaniem lekarza.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego.
- Nie stosować u noworodków (tzn. do 28 dnia życia)
- W przypadku występowania u dziecka długotrwałych i niewyjaśnionych dolegliwości brzusznych zawsze należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Działania niepożądane

- Brak doniesień o działaniach niepożądanych po zastosowaniu symetykonu.
- Z uwagi na fakt, że produkt przeznaczony jest do stosowania u niemowląt, wyrobu nie powinno się stosować równoległe z innymi lekami bez konsultacji z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych lub innych objawów niepożądanych, należy poinformować o nich wytwórcę.