

Bobotic Forte krople doustne 135 mg/ml 30 ml



Cena: 31,80 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	BOBOTIC
Opakowanie	30 ml
Postać	Krople
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące)
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dziecka, Dla niemowlaka

Opis produktu

Opis

Składnik zawarty w preparacie, czyli symetykon, skutecznie zmniejsza napięcie powierzchniowe ścian pęcherzyków gazu w jelitach, co ułatwia ich łączenie i pękanie. Ten proces przyczynia się do skutecznego wydalania gazów oraz redukuje napięcie jelit, które jest jednym z czynników powodujących dolegliwości bólowe. Warto zaznaczyć, że po podaniu doustnym symetykon nie jest wchłaniany z przewodu pokarmowego i całkowicie eliminowany jest z organizmu w postaci niezmienionej przez proces wydzielenia kałem.

Składniki

1 ml płynu zawiera 135mg symetykonu oraz substancje pomocnicze. 3 krople zawierają 20mg symetykonu oraz substancje pomocnicze.

Zastosowanie

Dla niemowląt od 28. dnia życia i dzieci do 12. lat w celu łagodzenia objawów, takich, jak kolka, wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie, niestrawność, związanych z nagromadzeniem gazu w obrębie przewodu pokarmowego; w przypadku przygotowania do badań diagnostycznych.

Sposób użycia

Niemowlęta od 28. dnia życia i dzieci do 2. lat: 3 krople (20mg symetykonu) podawać przed, w trakcie lub po każdym posiłku, nie należy przyjmować więcej niż 18 kropli na dobę (120g symetykonu); dzieci w wieku od 2. do 12. lat: 6 kropli (40mg symetykonu) przed, w trakcie lub po każdym posiłku, nie należy przyjmować więcej niż 36 kropli na dobę (240mg symetykonu).

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego.
- Nie stosować u noworodków (tzn. do 28 dnia życia)



Ostrzeżenia

- W przypadku występowania u dziecka długotrwałych i niewyjaśnionych dolegliwości brzusznych zawsze należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Producent

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański.