


Boldaloin, 30 tabletek

Cena: 16,48 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HERBAPOL
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	WROCLAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Przeznaczenie	Niestrawność, Trawienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Boldaloin to lek dostępny w postaci tabletek, który jest tradycyjnie stosowany do pobudzania wydzielania żółci i soku żołądkowego oraz regulowania częstości wypróżnień. Skuteczność tego leku w tych wskazaniach opiera się na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu. Składniki aktywne leku to wyciąg suchy z alony przyławkowej oraz boldyna. Produkt jest dostępny w opakowaniach zawierających 30 okrągłych tabletek, które są dwustronnie wypukłe.

Wskazania

- Tradycyjnie w niestrawności z uczuciem pełności w jamie brzusznej, zaburzeniach wydzielania żółci i soku żołądkowego, w lekkich skurczowych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych.
- Tradycyjnie w regulacji częstości wypróżnień (w łagodnych zaparciach związanych ze zmianą diety, miejsca pobytu).

Działanie

- Żółciotwórcze, rozkurczowe, przeczyszczające oraz ochronne na wątrobę.
- Zwiększające produkcję kwasu solnego w żołądku.

Dawkowanie

- dorośli: 3 razy dziennie po 1 tabletkę,
- młodzież powyżej 12 roku życia i osoby w podeszłym wieku: od 1 do 2 tabletek dziennie.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancje czynne: wyciąg suchy z Aloe ferox Miller (alona przylądkowa) 23,6 mg DER (2:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oczyszczona, boldyna 1,0 mg,
- substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, sacharoza, guma arabska, glicerol, talk, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Boldaloin:

- w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którąkolwiek z pozostałych składników tego leku.
- w przypadku marskości wątroby, niedrożności dróg żółciowych i przewodów pokarmowych, zwężenia przewodu pokarmowego, atonii jelit, zapalenia wyrostka robaczkowego, chorób zapalnych jelita grubego (np. choroba Crohna), bólów brzucha nieznanego pochodzenia, niewydolności nerek, biegunce, zaburzeniach równowagi elektrolitowej.

Działania niepożądane

- zaburzenia nerek i dróg moczowych (zmiana zabarwienia moczu).
- hipokaliemia,
- kolka żółciowa,
- reakcja alergiczna.

Ostrzeżenia

- Nie zaleca się długotrwałego stosowania ze względu na możliwość osłabienia perystaltyki jelit.
- W przypadku kamicy żółciowej, lek stosować wyłącznie przy konsultacji z lekarzem.
- Stosować ostrożnie w przypadku jednoczesnego stosowania leków moczopędnych.
- Unikać stosowania podczas miesiączki.
- Lek zawiera sacharozę - nie stosować u pacjentów, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów.