

Borazol, 30 mg/g, roztwór na skórę, 190 g

Cena: 25,95 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	190 g
Postać	Roztwór
Producent	POZNAŃSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne, Przeciwgrzybicze
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Roztwór na skórę **Borazol** to lek stosowany w przypadku stanów zapalnych skóry, wyprysków oraz powierzchownych uszkodzeń naskórka. Preparat zawiera kwas borowy, który działa przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie. Borazol jest przeznaczony dla osób powyżej 11. roku życia.

Wskazania

Borazol używa się w: stanach zapalnych skóry, wypryskach, oparzeniach, stłuczeniach, obrzękach zapalnych tkanek miękkich. Wskazaniem do zastosowania leku są również powierzchniowe uszkodzenia naskórka lub skóry oraz w stanach zapalnych zewnętrznych narządów moczopłciowych.

Działanie

Działanie Borazolu związane jest z jego substancją czynną, czyli kwasem borowym, który działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo.

Dawkowanie

Borazol przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę. Zwykle stosowane dawkowanie u pacjentów powyżej 11 roku życia to aplikacja Borazolu 2 do 3 razy dziennie. Roztwór należy nakładać w formie okładów, przymoczek lub płukań. Lek jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania.

Skład

Substancją czynną leku jest kwas borowy (Acidum boricum).

1 g roztworu zawiera 30 mg kwasu borowego.

Substancja pomocnicze: woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Borazol u osób uczulonych na kwas borowy. Przeciwwskazaniami do użycia roztworu są otwarte skaleczenia i



rozległe rany. Nie podawać Borasolu doustnie ani do oczu lub na duże powierzchnie skóry.

Działania niepożądane

W przypadku długotrwałego stosowania leku możliwe jest wystąpienie objawów przewlekłego zatrucia kwasem borowym, czyli zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zapalenie skóry, zaburzenia miesiączkowania, niedokrwistość, osłabienie, drgawki i wyłysienie.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem przyjmowania Borasolu należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Dłuższe leczenie powinno odbywać się wyłącznie pod kontrolą lekarza. W razie podrażnienia, zaczerwienienia skóry, należy zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady lekarza.

Producent

PROLAB
Przemysłowa 3
Nakło n/Notecią