

Braunol 7,5%, roztwór na skórę, 1000ml



Cena: 119,13 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	BRAUN
Opakowanie	1 l
Postać	Płyn
Producent	B.BRAUN MELSUNGEN AG
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Braunol 7,5% to roztwór na skórę przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego na skórę i błony śluzowe. Zawiera substancję czynną powidon jodowany z 10% zawartością jodu. Opakowanie zawiera 1000 ml.

Wskazania

Lek Braunol jest wskazany:

Do pojedynczego zastosowania:

- Dezynfekcja nieuszkodzonej skóry zewnętrznej oraz antyseptyka błony śluzowej, np. przed zabiegiem

-Chirurgicznym, biopsją, iniekcjami, nakłuciem, pobraniem próbki krwi i cewnikowaniem.

Do wielokrotnego użycia, ograniczonego w czasie:

- Antyseptyka ran (np. odleżyn, wrzodów na nogach), oparzeń, chorób skóry z infekcją i superinfekcją.
- Higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja rąk.

Dawkowanie

Należy stosować następujące proporcje przy rozcieńczaniu leku:

- Płukanie, jako jeden z etapów procesu leczenia ran (np. odleżyn, owrzodzenia goleni, gangreny) oraz do około-operacyjnego zapobiegania infekcji – od 1:2 do 1:20
- Mycie antyseptyczne – od 1:2 do 1:25
- Antyseptyczne moczenie kończyny: około 1:25

- Antyseptyczne moczenie ciała, około 1:100

Skład

100 g roztworu zawiera 7,5 g powidonu jednowodnego z 10% zawartością przyswajalnego jodu oraz wodę oczyszczoną, dwuwodorofosforan sodu, jodek sodu, makroogl eter laurylowy 9, wodorotlenek sodu.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- reakcje skórne w przypadku nadwrażliwości (alergii), np. późna alergia kontaktowa objawiająca się swędzeniem, zaczerwienieniem, pęcherzykami itp.
- ciężkie reakcje nadwrażliwości mogące zagrażać życiu (reakcje anafilaktyczne) obejmujące inne organy (np. skórę, układ oddechowy, układ krążenia).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- zaburzenia czynności tarczycy (nadczynność, niedoczynność), gdyż w wyniku długotrwałego stosowania leku Braunol mogą przeniknąć do organizmu znaczące ilości powidonu jodowanego (na przykład w leczeniu rozległych ran i oparzeń).
- zaburzenia osmozy surowicy krwi, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek oraz ciężka kwasica metaboliczna, w wyniku wchłonięcia się dużych ilości powidonu jodowanego do organizmu (na przykład podczas leczenia oparzeń).

Producent

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
D-34212 Melsungen
Niemcy