

Brodacid płyn 8 g

Cena: 19,61 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	BRODACID
Opakowanie	8 g
Postać	Płyn
Producent	GRUPA INCO S.A.
Przeznaczenie	Brodawki / kurczajki
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Brodacid to preparat w postaci płynu stosowany do leczenia różnych rodzajów brodawek, takich jak brodawki zwykłe, brodawki okołopaznokciowe, brodawki stóp i mozaikowe. Jego składniki aktywne to kwas salicylowy oraz kwas mlekowy. Kwas salicylowy działa keratolitycznie, co sprawia, że zmiękcza i rozpuszcza zrogowaciały naskórek, ułatwiając tym samym jego złuszczenie. Kwas mlekowy, będący środkiem żrącym, niszczy zrogowaciałą warstwę skóry. Dodatkowo, substancja pomocnicza w postaci dimetylosulfotlenku, obecna w składzie Brodacida, zwiększa przenikanie składników czynnych w głąb tkanki. Ważne jest stosowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza lub z instrukcjami na opakowaniu.

Wskazania

Leczenie brodawek zwykłych, około paznokciowych, brodawek stóp i mozaikowych.

Działanie

- Kwas salicylowy działa keratolitycznie: zmiękcza i rozpuszcza zrogowaciały naskórek.
- Kwas mlekowy niszczy zrogowaciałą warstwę skóry.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci po 12 roku życia: stosuj 2 razy na dobę.
- Dzieci od 2 do 12 roku życia: można stosować tylko pod kontrolą lekarza

Skład

1 g płynu zawiera:

- substancje czynne: kwas mlekowy 50,4 mg (w postaci roztworu 90%) i kwas salicylowy 100 mg oraz



- substancje pomocnicze: dimetylosulfotlenek, nitroceluloza (2:1 w etanolu) + etylu octan.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Brodacid:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne - kwas mlekowy lub kwas salicylowy, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w leczeniu brodawek płaskich i zmian zlokalizowanych w okolicy oczu, na błonach śluzowych oraz na twarzy,
- na znamiona owłosione i nieowłosione,
- na zakażoną lub zmienioną zapalnie skórę,
- w okresie ciąży i karmienia piersią,
- u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia

- Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, dokładnie dokręcać zakrętkę po każdorazowym użyciu.
- Chronić przed wyparowaniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa