

Bronchosol Produkt leczniczy syrop 200 ml



Cena: 22,80 zł

Opis słownikowy

| | |
|-----------------|---|
| Dla kogo | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Opakowanie | 200 ml |
| Postać | Syrop |
| Producent | PHYTOPHARM KLĘKA S.A. |
| Przeznaczenie | Kaszel mokry |
| Rodzaj produktu | Produkt leczniczy |
| Wiek | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 16 lat, Od 18 lat, Od 4 lat |

Opis produktu

Opis

Bronchosol (200 ml) to syrop stosowany w leczeniu kaszlu u osób dorosłych i dzieci powyżej 4. roku życia. Produkt leczniczy zawiera wyciąg z zieleń tymianku, wyciąg z korzeni pierwiosnka oraz tymol jako składniki aktywne. Bronchosol działa tradycyjnie jako środek wykrztuśny, który pobudza wydzielanie płynnego śluzu w oskrzelach. Jego skuteczność opiera się na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania

Lek Bronchosol stosuje się tradycyjnie u osób dorosłych i dzieci po 4. roku życia:

- w kaszlu i utrudnionym odkrztuszaniu (w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych).

Działanie

Wykrztuśne oraz pobudzające wydzielanie płynnego śluzu w oskrzelach.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku 4-6 lat: 2,5 ml syropu, 3 razy dziennie,
- Dzieci w wieku 6-12 lat: 5 ml syropu, 3 razy dziennie,
- Młodzież w wieku 12-18 lat: 10 ml syropu, 3 razy dziennie,
- Dorośli: 15 ml syropu, 3 razy dziennie.

Skład

100 ml syropu Bronchosol zawiera:

- substancje aktywne: wyciąg gęsty złożony (3:1) z zieleń tymianku i korzenia pierwiosnka (7,6/1 części) (Extractum compositum spissum ex: Thymi herba et Primulae radice) 4360 mg, rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda, tymol (Thymol) 19,8 mg,
- substancje pomocnicze: aromat pomarańczowy, sacharoza, woda oczyszczona.

Lek Bronchosol zawiera nie więcej niż 0,5% (m/m) etanolu.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować syropu Bronchosol w przypadku nadwrażliwości na tymol, pierwiosnek, tymianek lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Ponadto, nie powinno się go stosować u osób uczulonych na inne rośliny z rodziny jasnotowatych/wargowych (Lamiaceae/ Labiatae), a także u pacjentów z astmą. Nie jest zalecane podawanie syropu dzieciom chorującym obecnie lub w przeszłości na ostre krupowe zapalenie krtani (acute obstructive laryngitis).

Działania niepożądane

Lek Bronchosol, podobnie jak inne leki, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u każdej osoby. Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych po zastosowaniu syropu Bronchosol, jednak istnieje możliwość ich wystąpienia. Objawy niepożądane mogą obejmować zaburzenia żołądkowe, takie jak nudności i wymioty, oraz reakcje alergiczne.

Interakcje

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich stosowanych obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych wydawanych bez recepty.
- Interakcje Bronchosolu z innymi lekami nie są znane.

Ostrzeżenia

Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują po 7 dniach od rozpoczęcia stosowania syropu Bronchosol, lub jeśli wystąpi duszność, gorączka lub ropna wydzielina, należy skonsultować się z lekarzem. Osoby z objawami podrażnienia żołądka, zapaleniem i/lub wrzodami żołądka powinny zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku. Diabetycy powinni zwrócić uwagę, że jednorazowa dawka syropu zawiera około 4,2 g cukru (0,35 jednostki chlebowej) i pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów powinni skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

