


# Calpol 6 Plus Zawiesina doustna smak pomarańczowy 100 ml



Cena: 26,43 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	100 ml
Postać	Syrop
Producent	MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LTD.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 6 lat

## Opis produktu

### Opis

**Calpol 6 Plus** to lek w postaci syropu doustnego, który zawiera paracetamol jako substancję czynną. Działa on przeciwgorączkowo oraz przeciwbólowo.

Zastosowanie produktu Calpol 6 Plus jest wskazane w przypadku gorączki występującej w przebiegu przeziębienia, grypy, chorób wieku dziecięcego, a także w przypadku bólu o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu, obejmującego m.in. ból głowy, ból zęba, bóle mięśniowe, stawowe, kostne, a także bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych.

Lek Calpol 6 Plus 250 mg/5 ml jest przeznaczony do stosowania u dzieci powyżej 6. roku życia, młodzieży i dorosłych. Dołączona miarka ułatwia precyzyjne odmierzenie właściwej dawki leku.

### Wskazania

- Gorączka w przebiegu przeziębienia, grypy i chorób wieku dziecięcego.
- Ból o nasileniu małym do umiarkowanego taki jak ból głowy, ból zęba, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych.

### Działanie

Przeciwgorączkowe, przeciwbólowe.

### Dawkowanie

- Dzieci w wieku 6-8 lat: 5 ml do 4 razy na dobę,
- Dzieci w wieku 8-10 lat: 7,5 ml do 4 razy na dobę.
- Dzieci w wieku 10-12 lat: 10 ml do 4 razy na dobę.
- Młodzieży w wieku 12-16 lat: 10-15 ml do 4 razy na dobę.



- Dorośli i młodzieży powyżej 16 lat: 10-20 ml do 4 razy na dobę.

#### Skład

5 ml zawiesiny doustnej zawiera:

- substancję czynną: paracetamol 250 mg,
- pozostałe składniki: sacharoza, sorbitol 70% (niekrystalizujący), glicerol, zdyspergowana celuloza, polisorbat 80, metylu parahydroksybenzoesan, aromat cukrowy, aromat pomarańczowy, żółcień pomarańczowa (E 110), woda oczyszczona.

#### Przeciwwskazania

Nie stosować leku Calpol 6 Plus w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

#### Działania niepożądane

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: wysypka ze świądem lub bez, pokrzywka, reakcje skórne, zwiększenie aktywności aminotransferaz.

#### Ostrzeżenia

- Wraz z lekiem Calpol 6 Plus nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol.
- Stosowanie większych dawek może uszkodzić wątrobę.
- W przypadku stwierdzonej niewydolności wątroby, stosowanie leku omówić z lekarzem.
- Stosować ostrożnie w przypadku niewydolności nerek. U takich pacjentów wskazane jest wydłużenie odstępów pomiędzy poszczególnymi dawkami.
- Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu.
- W przypadku wystąpienia nowych objawów lub gdy ból/gorączka nasiliły się, należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek zawiera żółcień pomarańczową, która może powodować reakcje alergiczne.
- Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne, również typu późnego.
- Lek zawiera sorbitol, który posiada lekkie działanie przeczyszczające.
- Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła.

#### Producent

McNeil Healthcare (Ireland) Limited  
Airton Road, Tallaght Dublin 24, Irlandia