

Canespor, 10 mg/g, krem, 15 g

Cena: 46,72 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	15 g (tub.)
Postać	krem
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwygrzybicze
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Canespor to lek stosowany miejscowo w leczeniu grzybiczych zakażeń skóry.

Wskazania

Lek Canespor jest stosowany w miejscowym leczeniu zakażeń grzybiczych skóry.

Działanie

Bifonazol ma szeroki zakres działania przeciwygrzybiczego.

Dawkowanie

- Grzybice stóp w tym grzybica międzypalcowa: 3 tygodnie.
- Grzybica tułowia, dłoni i fałdów skórnych: 2-3 tygodnie.
- Łupież pstry: 2 tygodnie.
- Łupież rumieniowaty: 2 tygodnie.
- Kandydoza powierzchniowa skóry: 2-4 tygodnie.

Skład

- Substancją czynną leku jest bifonazol (Bifonazolum).
- Substancje pomocnicze: alkohol benzylowy, alkohol cetylostearylowy, cetylu palmitynian, polisorbat 60, oktylododekanol, woda oczyszczona, sorbitanu stearynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Canespor:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Częstość nieznana:

- ból w miejscu podania,
- obrzęk obrzeżny,
- kontaktowe zapalenie skóry,
- alergiczne zapalenie skóry,
- rumień,
- świąd,
- wysypka,
- pokrzywka,
- podrażnienie skóry,
- uczucie pieczenia na skórze.

Ostrzeżenia

- Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości na inne przeciwgrzybicze pochodne imidazoli, powinni ostrożnie stosować leki zawierające bifonazol.
- Jeżeli objawy choroby utrzymują się lub nie ustępują po przerwaniu leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.
- Należy unikać kontaktu leku z oczami.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

DELFARMA/BAYER