

## Carbo medicinalis 250 mg, 20 tabletek



Cena: 13,93 zł

### Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	CARBO MEDICINALIS MF
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	MEDICOFARMA S.A.
Przeznaczenie	Biegunka
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

### Opis produktu

#### Opis

**Carbo medicinalis MF** to produkt leczniczy stosowany w przypadku biegunek i wzdęć.

#### Działanie

Węgiel aktywny (węgiel leczniczy) posiada właściwości adsorbujące - wiąże na swojej powierzchni znajdujące się w przewodzie pokarmowym substancje, w tym nasilające perystaltykę i powodujące biegunkę (toksyny bakteryjne, bakterie, gazy jelitowe, produkty gnilne). Wykazuje działanie zapierające.

#### Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

- wzdęcia: 4-5 tabletek kilka razy na dobę aż do ustąpienia objawów,
- biegunka: 12-16 tabletek jednorazowo. Tabletki przed połknięciem należy rozkruszyć lub podgryźć. Najlepiej podawać w postaci wodnej papki przygotowanej z rozkruszonych tabletek.
- zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: jednorazowo podać 49-50 tabletek.

#### Skład

Substancją czynną jest: węgiel aktywny (węgiel leczniczy) (Carbo activatus).

1 tabletka zawiera 250 mg węgla aktywnego.

Substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza, karmeloza sodowa, magnezu stearynian.

#### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Carbo medicinalis MF:

- w przypadku uczulenia na węgiel leczniczy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

- u osób nieprzytomnych.

#### Działania niepożądane

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe (po dużych dawkach i wielokrotnym podaniu),
- zaparcia,
- wymioty (u dzieci).

#### Ostrzeżenia

- Lek należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę.
- Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia węglem aktywnym.
- Lek zawiera sacharozę - przyjęcie więcej niż 27 tabletek przekracza 5g/24h sacharozy.
- Lek zawiera laktozę.
- Pacjenci przyjmujący preparat przez 7 dni z powodu wzdęć lub 2 dni z powodu biegunki, u których pomimo leczenia utrzymują się objawy powinni skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli podczas leczenia biegunki wystąpi krew w stolcu lub gorączka, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.