

Cefalgin, 10 tabletek

Cena: 11,01 zł



Opis słownikowy

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Dla kogo | Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Opakowanie | 10 tabletek |
| Postać | Tabletka |
| Producent | ADAMED PHARMA S.A. |
| Przeznaczenie | Ból, Gorączka, Migrena, Nerwoból |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty |
| Wiek | Dla dorosłych, Dla seniorów |

Opis produktu

Opis
Cefalgin to produkt leczniczy do stosowania w bólach o słabym do umiarkowanego nasilenia oraz w gorączce.

Wskazania
Bóle o słabym lub umiarkowanym nasileniu: migrenowe bóle głowy, bóle zębów, bóle miesiączkowe, nerwobóle, gorączka.

Działanie
Cefalgin jest lekiem złożonym, zawierającym jako substancje czynne paracetamol i propyfenazon o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym oraz małą dawkę kofeiny. Substancje czynne wchodzące w skład leku wspomagają wzajemnie swoje działanie. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Dawkowanie
Dorośli: jednorazowo 1-2 tabletki.

Skład
1 tabletkę zawiera: substancje czynne: paracetamol 250mg, propyfenazon 150mg, kofeinę 50mg; pozostałe substancje pomocnicze to: skrobia ziemniaczana, sodu laurylosiarczan, alkohol poliwinylowy, żelatyna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Cefalgin:

- w przypadku nadwrażliwości na paracetamol, kofeinę, kwas acetylosalicylowy lub którąkolwiek z substancji pomocniczych,
- w przypadku nadwrażliwości na pirazolony lub pochodne tych związków (fenazon, propyfenazon, aminofenazon, fenylobutazon, metamizol),
- jeśli pacjent choruje na: ciężką niewydolność wątroby i/lub nerek, nadciśnienie, chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, chorobę alkoholową, ostrą porfirię wątrobową,
- jeśli u pacjenta występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, zmiany w obrazie krwi obwodowej

(niedokrwistość, agranulocytoza, leukopenia).

Działania niepożądane

- zaburzenia wątroby i dróg żółciowych,
- zaburzenia nerek i dróg moczowych,
- rumień, wysypka, świąd, pokrzywka,
- nudności, bóle brzucha, wymioty, pieczenie,

Ostrzeżenia

- Podczas stosowania leku Cefalgin nie należy spożywać alkoholu.
- Lek należy stosować ostrożnie u osób starszych ze względu na obecność kofeiny.
- Nie stosować z innymi produktami zawierającymi paracetamol.
- Długotrwałe stosowanie może prowadzić do zaburzonej pracy wątroby i nerek.
- Lek należy stosować ostrożnie w przypadku: niewydolności wątroby / nerek, zaburzeń hemopoezy, astmy.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.