

## Cerutin 125 tabletek



Cena: 12,31 zł

### Opis słownikowy

Dla kogo	, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	CERUTIN
Opakowanie	125 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	POLFARMEX S.A.
Przeznaczenie	Niedobór witamin, Obniżona odporność, Przeziębienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

### Opis produktu

#### Opis

**Polfarmex Cerutin 100 mg + 25 mg** to lek dostępny w postaci żółtych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych. Jest przeznaczony dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci, które są w stanie połknąć tabletkę. Skład preparatu obejmuje witaminę C oraz rutozyd, który działa przedłużająco na jej działanie poprzez opóźnienie utleniania kwasu askorbowego. Składniki aktywne leku mają zdolność zmniejszania przepuszczalności naczyń krwionośnych oraz wzmacniania ich ścian.

#### Wskazania

Lek Cerutin stosuje się u dzieci, młodzieży, oraz dorosłych:

- w stanach niedoboru witaminy C i rutozydu, w celu wspomaganie odporności organizmu,
- do uszczelnienia naczyń włosowatych, w celu zapobiegania przeziębieniom i łagodzenia objawów grypy.

#### Działanie

Wspomagające odporność organizmu, zapobiegające przeziębieniom i łagodzące objawy grypy (uszczelniające naczynia włosowate).

#### Dawkowanie

- **Dorośli:** profilaktycznie 1-2 tabletki na dobę. W stanach zwiększonego zapotrzebowania 2-4 razy na dobę 1 lub 2 tabletki.
- **Dzieci i młodzież do 12 roku:** profilaktycznie 1 tabletkę na dobę. W stanach niedoboru witaminy C 2 razy na dobę 1 do 2 tabletek.
- **Młodzież w wieku powyżej 12 roku:** profilaktycznie 1 do 2 tabletek na dobę. W stanach niedoboru witaminy C 2-4 razy na dobę 1 do 2 tabletek.

#### Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancje czynne: 100 mg kwasu askorbowego, 25 mg rutozydu trójwodorowego;
- pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian; otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogl 6000, żelaza tlenek żółty (E172).

#### Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

#### Działania niepożądane

- nudności;
- wymioty;
- niestrawność;
- biegunka;
- wysypka;
- ból głowy.

#### Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

#### Ostrzeżenia

- Produkt leczniczy należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami syntezy hemoglobiny i hemochromatozą.
- Witamina C w dużych dawkach może powodować nasilenie wydalania kwasu szczawowego, dny, kamicy moczanowej, cystynurii, hipokaliemii, hiperkalcemii.
- Nie zaleca się równoczesnego stosowania rutyny i suflatazolu z uwagi na zwiększenie ryzyka uszkodzenia naczyń krwionośnych i krwotoków.
- Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

#### Producent

Polfarmex S.A.  
ul. Józefów 9  
99-300 Kutno