

# Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki 2 mg, 40 tabletek do ssania

Cena: 24,48 zł



## Opis słownikowy

|                 |   |
|-----------------|---|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn                                |
| Marka           | CHLORCHINALDIN  |
| Opakowanie      | 40 tabletek   |
| Postać          | Tabletka do ssania                                      |
| Producent       | PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.                     |
| Przeznaczenie   | Antybakteryjne (przeciwbakteryjne),<br>Przeciwgrzybicze |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty   |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów              |

## Opis produktu

### Opis

**Chlorchinaldin** to środek antyseptyczny przeznaczony do leczenia infekcji jamy ustnej i gardła. Skuteczny w przypadku infekcji bakteryjnych i grzybiczych w obszarze dziąseł, jamy ustnej oraz gardła, w tym tzw. grzybicy poantybiotykowej.

### Wskazania

Do stosowania miejscowego: w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, pleśniawkach, zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

### Działanie

Przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwpierwotniakowe.

### Dawkowanie

Dorośli: ssać 1 tabletkę co 1-2 godziny.

### Skład

1 tabletkę do ssania zawiera:

- substancja czynna: chlorochinaldol 2 mg,
- pozostałe składniki: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, karmeloza sodowa, talk, aromat czarnej porzeczki (zawierający m.in. glikol propylenowy (E1520), d-limonen, linalol), magnezu stearynian.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki:



- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorochinaldol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

#### **Działania niepożądane**

- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: podrażnienie błony śluzowej, świąd, objawy alergiczne.
- Zaburzenia układu immunologicznego: objawy alergiczne (wysypka lub pokrzywka) u osób nadwrażliwych.

#### **Ostrzeżenia**

Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku przez kilka dni, należy zgłosić się do lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie. W zakażeniach bakteryjnych często konieczne jest zastosowanie odpowiedniego antybiotyku o działaniu ogólnoustrojowym, a Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki stosuje się jedynie pomocniczo.

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może wpływać szkodliwie na zęby.

#### **Producent**

Bausch Health Ireland Limited  
Lake Drive Citywest Business  
3013 Campus Dublin 24, D24PPT3 Irlandia