

Cirrus Duo (Cirrus), 5 mg+120 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 6 tabletek

Cena: 22,80 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	6 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	VEDIM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Cirrus Duo to lek o działaniu przeciwalergicznym i udrażniającym nos, przeznaczony do łagodzenia objawów takich jak uczucie zatkanego nosa, kichanie, katar, swędzenie oraz reakcje alergiczne związane z zapaleniem błony śluzowej nosa.

Wskazania

Leczenie objawowe sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (przekrwienie błony śluzowej nosa, kichanie, wodnista wydzielina z nosa - katar, świąd nosa i spojówek).

Działanie

Cirrus Duo zawiera 2 substancje czynne, które odpowiednio odpowiadają za działanie przeciwalergiczne (cetyryzyna) i zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa (pseudoefedryna). Pseudoefedryna obkurcza naczynia krwionośne w błonie śluzowej nosa. Cirrus Duo łagodzi objawy związane z całorocznym i sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

Dawkowanie

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1 tabletkę 2 razy na dobę (rano i wieczorem).

Skład

- Substancjami czynnymi są: pseudoefedryna (Pseudoephedrini hydrochloridum) i cetyryzyna (Cetirizini dihydrochloridum).
- Substancje pomocnicze: warstwa o natychmiastowym uwalnianiu: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroscarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; warstwa o przedłużonym uwalnianiu: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka Opadry Y-1-7000 white: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cirrus Duo:

- w przypadku uczulenia na substancje czynne leku (cetyryzyna, pseudoefedryna), efedrynę, piperazynę lub jej pochodne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie nadciśnienie tętnicze, ciężką chorobę niedokrwienną serca, ciężką niewydolność nerek, niewyównaną nadczynność

tarczycy, ciężkie zaburzenia rytmu serca, guz chromochłonny rdzenia nadnerczy, jaskrę, zwiększone ciśnienie śródgałkowe,

- jeśli u pacjenta występuje zatrzymanie moczy,
- jeśli pacjent przeżył udar mózgu,
- jeśli pacjent należy do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia udaru krwotocznego mózgu,
- jeśli są stosowane leki jak dihydroergotamina, inhibitory MAO (lub w ostatnich 26 tygodniach IMAO były przyjmowane),
- u osób poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- bezsenność, nerwowość, senność,
- bóle głowy, zawroty głowy,
- przyspieszone bicie serca,
- suchość błony śluzowej jamy ustnej,
- nudności,
- osłabienie.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- pobudzenie,
- niepokój.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- drgawki, drżenie,
- zaburzenia rytmu serca,
- suchość skóry, wysypka, pokrzywka, zwiększona potliwość,
- wysokie ciśnienie krwi,
- reakcje nadwrażliwości,
- omamy,
- błądność,
- bolesne / utrudnione oddawanie moczu.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- zaburzenia smaku,
- wysypka polekowa,
- obrzęk naczynioruchowy,
- zapaść krążeniowa,
- zaburzenia psychiczne.

Ostrzeżenia

- Należy zachować ostrożność jeśli u pacjenta stwierdzono: cukrzycę, nadczynność tarczycy, nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, zaburzenia rytmu serca, umiarkowaną niewydolność nerek lub wątroby.
- Stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku, jeśli pacjent przyjmuje leki sympatykomimetyczne (np. zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, zmniejszające łaknienie), TLPD, leki przeciwnadciśnieniowe, leki hamujące czynność OUN, glikozydy nasercowe (digoksyna), u pacjentów z przerostem gruczoły krokowego lub przy trudnościach z oddawaniem moczu.
- Należy zachować ostrożność, jeśli u pacjenta występują czynniki ryzyka udaru krwotocznego mózgu.
- Łączne stosowanie pseudoefedryny i NLPZ może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego.
- Przed zastosowaniem leku u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby należy poradzić się lekarza.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Lek zawiera laktozę - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

VEDIM SP.Z O.O.
Leona Kruczkowskiego 8
Warszawa