

Claritine Active, 5 mg + 120 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 6 tabletek

Cena: 28,79 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	6 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Claritine Active to lek o wydłużonym czasie działania, zapewniający długotrwałą ulgę w objawach.

Wskazania

Lek Claritine Active stosowany jest w leczeniu objawów okresowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, którym towarzyszy przekrwienie błony śluzowej nosa.

Działanie

- Loratadyna pomaga zmniejszyć objawy alergiczne poprzez zahamowanie działania w organizmie substancji zwanej histaminą.
- Pseudoefedryna pomaga zmniejszyć przekrwienie błony śluzowej nosa.

Dawkowanie

Zalecana dawka: 1 tabletkę 2 razy na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są loratadyna (Loratadinum) i pseudoefedryny siarczan (Pseudoephedrini sulfas).
- 1 tabletkę zawiera 5 mg loratadyny i 120 mg pseudoefedryny siarczanu.
- Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian; skład otoczki: guma akacjowa, sacharoza, wapnia siarczan dwuwodny, wapnia siarczan bezwodny, kalafonia, zeina, kwas oleinowy, mydło neutralne, talk, celuloza mikrokrystaliczna, tytanu dwutlenek, воск biały, воск Carnauba.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Claritine Active:

- jeśli pacjent ma uczulenie na loratadynę, pseudoefedrynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem przesączania, nadczynność tarczycy, trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu, wysokie ciśnienie tętnicze, choroba serca lub naczyń krwionośnych,
- jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpił udar mózgu lub występuje ryzyko udaru mózgu,
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat,
- u kobiet w ciąży.

Działania niepożądane

Bardzo często występujące działania niepożądane (1 na 10 pacjentów):

- bezsenność.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

- pragnienie,
- nerwowość,
- senność,
- depresja,
- pobudzenie,
- brak apetytu,
- zawroty głowy,
- suchość w jamie ustnej,
- zapalenie gardła,
- zaparcia,
- nudności,
- bóle głowy,
- uczucie zmęczenia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

- dezorientacja,
- drżenie,
- zwiększona potliwość,
- uderzenie gorąca,
- zaburzenie smaku,
- wzmożone łzawienie,
- szumy w uszach,
- kołatanie serca,
- krwawienie z nosa,
- świąd.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (1 na 10000 pacjentów):

- wysypka,
- pokrzywka,
- zawroty głowy,
- drgawki,
- wysokie ciśnienie krwi,
- kaszel,
- trudności w oddychaniu,
- zatrzymanie moczu,
- łysienie.

Ostrzeżenia

- Należy przerwać stosowanie leku Claritine Active i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli u pacjenta wystąpią objawy takie jak: gorączka, wysypka lub małe krostki na całym ciele.
- Przez zabiegiem chirurgicznym należy wówczas przerwać stosowanie leku Claritine Active na 24 godziny przed takim zabiegiem.
- Lek Claritine Active ma właściwości uzależniające, które mogą wystąpić, jeśli pacjent przyjmuje lek przez okres dłuższy niż

zalecany.

- Przyjmowanie dawek większych niż zalecane może być przyczyną zatrucia.
- Stosowanie leku Claritine Active może być przyczyną dodatnich wyników testów antydopingowych.
- Lek Claritine Active zawiera laktozę i sacharozę, jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Claritine Active.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
SCHERING PLOUGH
Taśmowa 7
Warszawa

Galeria

