

Claritine Allergy Syrop 60 ml



Cena: 28,43 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	CLARITINE
Opakowanie	1 butelka po 60 ml
Postać	Syrop
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Claritine Allergy działa łagodząco na objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, takimi jak kichanie, swędzenie, wodnista wydzielina z nosa, a także na objawy pokrzywki idiopatycznej, takie jak swędzenie, zaczerwienienie skóry.

Wskazania

- katar alergiczny,
- leczenie objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa takich jak: kichanie, wyciek z nosa, swędzenie i łzawienie oczu,
- przewlekła pokrzywka idiopatyczna (swędzenie, zaczerwienienie skóry).

Działanie

Przeciwalergiczne.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 ml syropu (2 miarki po 5 ml) raz na dobę.
- Dzieci od 6 do 12 lat (masa ciała większa niż 30 kg): 10 ml syropu (2 miarki po 5 ml) raz na dobę.
- Dzieci od 6 do 12 lat (masa ciała mniejsza niż 30 kg): stosowanie leku nie jest wskazane!

Skład

1 ml syropu zawiera:

- substancję czynną: loratadynę 1 mg,
- substancje pomocnicze: glikol propylenowy, glicerol, sodu benzoesan, sukraloza, maltitol ciekły, sorbitol ciekły krystalizujący, aromat winogronowy 936.1368U, sodu diwodorofosforan dwuwodny, kwas fosforowy, disodu edetynian, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Claritine Allergy: w przypadku uczulenia na loratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; u kobiet w ciąży.

Działania niepożądane

Dorośli i młodzież: sennaść.

Niezbyt często występujące działania niepożądane: ból głowy, zwiększony apetyt i problemy ze snem, zmęczenie, suchość w jamie ustnej, zaburzenia żołądkowo-jelitowe takie jak nudności, zapalenie błony śluzowej żołądka i objawy alergiczne takie jak wysypka.

Ostrzeżenia

- Lek stosować ostrożnie w przypadku zaburzeń czynności wątroby. Stosowanie leku omówić z lekarzem.
- W przypadku testów alergicznych skórnych, na 2 dni przed planowanym badaniem należy odstawić stosowanie leku Claritine Allergy ze względu na wpływ na wynik testów.
- Lek zawiera sacharozę - jest to informacja istotna dla osób z cukrzycą, 1 ml syropu zawiera 0,6 g sacharozy.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 1 miesiąc.

Producent

BAYER SP. Z O.O.
Aleje Jerozolimskie 158
Warszawa

Galeria

