

Clotidal Krem dopochwowy 35 g (6 sztuk)

Cena: 21,06 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Marka	CLOTIDAL
Opakowanie	1 tub. po 35 g
Postać	krem
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Grzybica, Infekcja, Zakażenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Clotidal to produkt leczniczy w postaci kremu dopochwowego z dołączonymi aplikatorami o pojemności 5 ml, który zawiera substancję o działaniu przeciwgrzybiczym - klotrymazol. Lek stosuje się podczas grzybiczego zapalenia błon śluzowych narządów płciowych. Clotidal można stosować również u mężczyzn podczas zakażenia żołądki (zwieńczenia prącia). Lek jest przeznaczony dla osób od 16 lat.

Wskazania

- grzybiczego zapalenia błon śluzowych narządów płciowych wywołanego przez drożdżaki (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy),
- zakażenie żołądki prącia przez drożdżaki (Candida).

Działanie

Substancja czynną leku Clotidal jest klotrymazol, który wykazuje szerokie spektrum działania przeciwgrzybiczego. Działanie to polega na osłabieniu struktury i funkcjonowania błony cytoplazmatycznej grzybów. Oprócz aktywności przeciwgrzybiczej, klotrymazol oddziałuje również na mikroorganizmy gram-dodatnie (paciorkowce/gronkowce/Gardnerella vaginalis) oraz gram-ujemne (pałeczki Bacteroides).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku przepisania leku przez lekarza, należy postępować zgodnie ze wskazaniami lekarza przy jego stosowaniu.

Skład

1 g kremu dopochwowego zawiera

- substancję czynną: klotrymazol 10 mg,
- pozostałe składniki: cetylu palmitynian, oktylododekanol, polisorbát 60, sorbitanu stearynian, alkohol benzylowy, alkohol cetostearylowy, woda oczyszczona.

Sposób użycia

- Umyć ręce, następnie wysunąć tłoczek aplikatora aż do oporu.
- Do otwartej tuby z kremem dołączyć aplikator. Przytrzymując je razem napełnić aplikator delikatnie ściskając tubę.
- Odłączyć aplikator od tuby. Aplikator umieścić najgłębiej jak można w pochwie (wskazana pozycja leżąca). Następnie przycisnąć tłoczek aż do całkowitego opróżnienia aplikatora.
- Zużyty aplikator wyjąć i wyrzucić. Umyć ręce.

Przeciwwskazania

- jeśli pacjent ma uczulenie na klotrymazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Clotidal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości, które mogą objawiać się między innymi:

- omdleniem, niskim ciśnieniem krwi (niedociśnienie),
- problemami z oddychaniem (duszność), opuchlizną (obrzęk) oraz pokrzywką.

Może wystąpić:

- łuszczenie się skóry okolic narządów płciowych,
- swędzenie (świąd), wykwity skórne, zacerwienie (rumień),
- uczucie dyskomfortu, pieczenie, podrażnienie,
- ból miednicy mniejszej, krwotok z narządów rodnych, ból brzucha.

Interakcje

Clotidal może wchodzić w interakcje z:

- doustnymi lekami zawierającymi takrolimus lub syrolimus,
- amfoterycyną i innymi antybiotykami polienowymi (np. nystatyną, natamycyną),
- miejscowo stosowanymi lekami zawierającymi silnie działające sterydy.

Ostrzeżenia

Nie należy stosować leku podczas miesiączki. Pełny cykl leczenia należy zakończyć przed rozpoczęciem menstruacji.

Przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

- pacjent (lub pacjentka) nie jest pewien czy ma objawy drożdżycy lub objawy te występują po raz pierwszy,
- pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że jest w ciąży,
- pacjentka lub jej partner przechodzili kiedykolwiek chorobę przenoszoną drogą płciową,
- w ciągu ostatnich 6 miesięcy wystąpiły co najmniej 2 epizody zakażeń grzybiczych sromu i pochwy.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku występowania któregokolwiek z poniższych objawów:

- gorączki lub dreszczy,
- nieregularnego krwawienia z pochwy, nieprawidłowego krwawienia lub plamienia z pochwy,
- owrzodzenia, nadżerek lub pęcherzy okolic sromu lub pochwy,
- bólu w dole brzucha lub bólu przy oddawaniu moczu,
- jakichkolwiek działań niepożądanych, takich jak podrażnienie lub obrzęk, związanych z leczeniem,
- nudności i wymiotów, biegunki,
- wydzieliny z pochwy o przykrym zapachu,
- bólu pleców,
- bólu miednicy.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Uwagi

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław