

Clotidal MAX, 500 mg, tabletki dopochwowe, 1 tabletka

Cena: 38,79 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	1 tabletka
Postać	Tabletka dopochwowa
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwwgrzybicze
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Lek Clotidal MAX jest stosowany w terapii zakażeń pochwy i sromu (zewnątrznych narządów płciowych kobiet) spowodowanych przez grzyby, najczęściej rodzaju *Candida*, które są wrażliwe na klotrymazol. Produkt przeznaczony jest dla nastolatek od 16 roku życia oraz dorosłych kobiet.

Wskazania

Clotidal MAX przeznaczony jest do miejscowego leczenia ginekologicznych infekcji grzybiczych.

Działanie

Lek Clotidal MAX ma działanie przeciwwgrzybicze.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat: Jedna tabletka dopochwowa, głęboko dopochwowo, w dawce jednorazowej, przed snem.
- Młodzież w wieku od 12 do 15 lat : U młodzieży w wieku poniżej 16 lat, Clotidal MAX można stosować tylko po konsultacji z lekarzem. W przypadku stosowania produktu leczniczego w tej grupie pacjentek (po pierwszej miesiączce), zalecane dawkowanie jest takie samo, jak u dorosłych.

Skład

- Substancja czynna jest klotrymazol.
- Każda tabletka dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu (Clotrimazolum).
- Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, kwas adypinowy, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane

- Często (częściej niż u 1 na 100 osób): pieczenie;
- Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1 000 osób): ból brzucha, swędzenie, zaczerwienienie skóry i (lub) podrażnienie;
- Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 osób): reakcje alergiczne, obrzęk, wysypka skórna, krwawienie z pochwy;
- Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): złuszczenie w obrębie narządów płciowych, uczucie dyskomfortu, bóle w obrębie miednicy.

Ostrzeżenia

- Należy skonsultować się z lekarzem, w przypadku: gdy do zakażenia doszło po raz pierwszy, gdy wystąpiły co najmniej 4 zakażenia w ciągu ostatniego roku, gorączki ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), bólu w dolnej części brzucha, bólu pleców, cuchnących upławów, nudności, krwawienia z pochwy i (lub) bólu w ramionach.
- Należy zapewnić wilgotne środowisko pochwy, aby tabletki rozpuściła się całkowicie. W przeciwnym wypadku nierozpuszczone części tabletki mogą wysłizgnąć się z pochwy. Aby tego uniknąć zaleca się umieszczenie tabletki tak głęboko dopochwowo, jak to możliwe, przed położeniem się do łóżka.

Nie należy stosować produktu leczniczego Clotidal MAX w trakcie miesiączki. Należy zakończyć stosowanie tego produktu leczniczego przed rozpoczęciem krwawienia miesięczkowego.

Partner seksualny również powinien zostać poddany miejscowemu leczeniu, jeżeli występują u niego objawy, takie jak np. świąd, stan zapalny.

- Tampony, płukanie pochwy, środki plemnikobójcze lub inne produkty do stosowania dopochwowego nie powinny być stosowane jednocześnie z tym produktem leczniczym.
- Podczas stosowania produktu leczniczego Clotidal MAX należy unikać stosunków płciowych, ponieważ infekcja może być przeniesiona na partnera seksualnego.

Niezawodność i skuteczność antykoncepcyjna środków antykoncepcyjnych, takich jak lateksowe prezerwatywy i krążki dopochwowe, może być zmniejszona.

- Tabletek nie należy połykać.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

US PHARMACIA WROCLAW
Ziębicka 40
Wrocław