

Clotrimazolum Ziaja, 1%, krem, 20 g



Cena: 6,40 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ZIAJA
Opakowanie	20 g (tub.)
Postać	krem
Producent	ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwczybotyczny
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Clotrimazolum Ziaja to lek w formie kremu, który zawiera klotrymazol, będący pochodną imidazolu o właściwościach grzybobójczych.

Wskazania

Clotrimazolum Ziaja zaleca się w przypadku:

- grzybica skóry, które zostały wywołane przez różne gatunki dermatofitów, zwłaszcza: grzybica pachwin, dłoni, stóp, grzybica międzypalcowa, łupież pstry,
- kandydozy skóry oraz błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych.

Działanie

Klotrymazol hamuje rozwój większości grzybów powodujących zakażenia skóry u ludzi. Clotrimazolum Ziaja posiada na szerokie spektrum działania grzybobójczego: dermatofity - Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton; drożdżaki - Candida, grzyby pleśniowe i grzyby dimorficzne.

Dawkowanie

Zwykle chorobowo zmienione miejsca smaruje się cienką warstwą Clotrimazolum Ziaja od 2 do 3 razy na dobę, przy tym lekko wcierając.

Skład

- Substancją czynną leku jest: klotrymazol (Clotrimazolum).
- 1 g kremu zawiera 10 mg klotrymazolu.
- Substancje pomocnicze: alkohol benzylowy, sorbitanu stearynian, polisorbat 60, cetylu palmitynian, oktylododekanol. alkohol cetostearylowy, woda oczyszczona.



Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku:

- w przypadku w nadwrażliwości na klotrymazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów):

- reakcje skórne (zaczerwienienia skóry, pieczenie, podrażnienie);
- mogą wystąpić ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, ból oraz reakcje miejscowe, jak świąd i wysypka.

Ostrzeżenia

- W przypadku stosowania na błony śluzowe zewnętrznych narządów płciowych Clotrimazolum Ziaja może uszkadzać środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu (prezerwatywy oraz krążki domaciczne), z tego powodu odradza się ich stosowanie podczas terapii tym lekiem.
- Nie należy stosować środków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu co najmniej przez 5 dni po zastosowaniu leku.
- Należy unikać kontaktu leku z oczami i ustami.
- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

ZIAJA
Jesienna 9
Gdańsk