

Coldrex Complex Grip 500 mg + 100 mg + 6,1 mg, 16 kapsułek



Cena: 43,57 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	COLDREX
Opakowanie	16 kapsułek
Postać	Kapsułka
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Coldrex Complex Grip to produkt leczniczy w postaci kapsułek, które są przeznaczone do tymczasowego złagodzenia objawów grypy i przeziębienia. Objawy te mogą obejmować ból głowy, katar, ból gardła, dreszcze, gorączkę oraz ułatwianie odkrztuszania przy kaszlu.

Wskazania

Lek Coldrex Complex Grip stosuje się w celu łagodzenia objawów przeziębienia i grypy.

Działanie

Przeciwbólowe na bóle: głowy i gardła, przeciwgorączkowe, ułatwiające odkrztuszanie, zmniejszenia obrzęku przewodów nosowych.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku 16 lat i starsza o masie ciała powyżej 50 kg: 2 kapsułki co 4 do 6 godzin, w zależności od potrzeby, maksymalnie do 3 dawek w ciągu 24 godzin.

Skład

1 kapsułka zawiera:

- substancje czynne: paracetamol (500 mg), gwajafenezyna (100 mg) i fenylefryny chlorowodorek (6,1 mg, co odpowiada 5 mg fenylefryny),
- pozostałe składniki leku to: skrobia kukurydziana, kroscarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, talk; kapsułka żelatynowa: żelatyna,

sodu laurylosiarczan, żółcień chinolinowa (E104), indygotyna (E132), erytrozyna (E127), tytanu dwutlenek (E171), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku: nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; pacjentów przyjmujących obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni inhibitory monoaminooksydazy; nadciśnienia; choroby sercowo-naczyniowej; nadczynność tarczycy; cukrzycy; guza chromochłonnego; pacjentów przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, beta-blokery lub inne leki przeciwnadciśnieniowe; jaskry z zamkniętym kątem; ciężkiego zaburzenia czynności wątroby; ciąży.

Działania niepożądane

- Częstość występowania poniższych działań niepożądanych nie jest znana: trudności ze snem (bezsenność); nerwowość; ból głowy; zawroty głowy; uczucie mrowienia lub chłodu na skórze.
- Częstość występowania poniższych działań niepożądanych jest rzadka: ból brzucha lub uczucie dyskomfortu, biegunka, nudności, wymioty.

Ostrzeżenia

- Należy zachować ostrożność u pacjentów: mających problemy z wątrobą lub nerkami; z niedowagą; z problemami z krążeniem; przyjmujących leki, które wpływają na czynność wątroby; cierpiących na niedobór enzymów lub zaburzenia metaboliczne (niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, niedobór glutationu lub rodzinna żółtaczką niehemolityczna); cierpiących na zaburzenie, które powoduje szybsze niszczenie czerwonych krwinek niż ich wytworzenie (niedokrwistość hemolityczna); odwodnionych; mających trudności z oddawaniem moczu lub powiększona prostata; cierpiących na przewlekły kaszel, astmę lub rozedmę płuc; mających częste lub codzienne bóle głowy; z astmą; wrażliwych na kwas acetylosalicylowy.
- Należy poinformować lekarza jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni lub nasilają się.
- Ten produkt zawiera paracetamol. Nie należy stosować tego produktu jednocześnie z innymi produktami zawierającymi paracetamol.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

Perrigo Poland Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18 BTD Office Center, 2 piętro
02-653 Warszawa

Galeria

