

Coldrex Complex Grip 500 mg + 200 mg + 10 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, smak cytrynowo-miętowy, 10 saszetek



Cena: 45,15 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	COLDREX
Opakowanie	10 saszetek
Postać	Proszek
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Coldrex Complex Grip to lek w postaci proszku do przygotowania roztworu doustnego, który jest stosowany doraźnie w łagodzeniu objawów grypy i przeziębienia.

Wskazania

Lek Coldrex Complex Grip stosuje się u osób dorosłych w przypadku:

- bólu głowy,
- bólu mięśni,
- nieżytu nosa,
- bólu gardła,
- dreszczy i gorączki.

Działanie

Krótkotrwałe, doraźne łagodzenie objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie.

Dawkowanie

Dorośli, pacjenci w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 1 saszетка co 4 godziny, w razie potrzeby.

Skład

1 saszетка leku Coldrex Complex Grip zawiera:

- substancje czynne: paracetamol 500 mg, gwajafenezyna 200 mg i fenylefryny chlorowodorek 10 mg
- substancje pomocnicze: sacharoza, aspartam (E 951), sodu cytrynian i sodu cyklaminian (E 952).

Przeciwwskazania

- Stosowanie leku Coldrex Complex Grip jest przeciwwskazane jeżeli występuje: nadwrażliwość na paracetamol, gwajafenezynę, fenylefrynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Nie należy stosować leku u Pacjentów w przypadku zaburzeń czynności wątroby i nerek, chorób serca, zaburzeń sercowo-naczyniowych, ciężkiej niedokrwistości hemolitycznej, nadciśnienia, nadczynności tarczycy, cukrzycy, guza chromochłonnego, jaskry i zatrzymania oddawania moczu.

Działania niepożądane

- Często : problemy ze snem (bezsenność), biegunka, nudności, nerwowość, drżenia, rozdrażnienie, niepokój lub pobudliwość, podwyższone ciśnienie krwi z bólem głowy, zawrotami głowy, wymiotami i nieregularnym rytmem serca (kołatanie serca).
- Rzadko: ból brzucha i uczucie dyskomfortu, problemy z wątrobą, zbyt szybki lub za wolny rytm serca, zaburzenia w obrębie oka, problemy z oddawaniem moczu.
- Bardzo rzadko: reakcje alergiczne, które mogą być ciężkie, takie jak wysypka, problemy z oddychaniem, łuszczenie

skóry, świąd, obrzęknięte czerwone obszary skóry, czasem duszność lub obrzęk jamy ustnej, warg, języka, gardła lub twarzy, zwiększona podatność na krwawienia, powstawanie sińców, gorączka i zakażenia, takie jak zapalenie gardła lub owrzodzenia, ze względu na zmiany we krwi.

Ostrzeżenia

- Należy zachować ostrożność u Pacjentów z alkoholową chorobą wątroby dusznicą bolesną, astmą czy dusznością oraz ciężkimi chorobami żołądka i jelit, miastenią rzekomoporażną, przerostem gruczołu krokowego, chorobami sercowo-naczyniowymi. Wskazana jest konsultacja z lekarzem
- Nie należy stosować leku dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem.
- Lek zawiera sacharozę, aspartam i sól.
- Zawiera paracetamol. Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.
- Nie stosować z innymi lekami na przeziębienie, gripę lub obkurczającymi naczynia.
- Nie należy przyjmować łącznie z lekami przeciwkaszlowymi.

Producent

Perrigo Poland Sp.z o.o.
Al. Niepodległości 18 BTD Office Center, 2 piętro
02-653 Warszawa

Galeria

