

# Coldrex Maxgrip C, 12 tabletek



Cena: 33,14 zł

## Opis słownikowy

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn                   |
| Marka           | COLDREX                                    |
| Opakowanie      | 12 tabletek                                |
| Postać          | Tabletki                                   |
| Producent       | PERRIGO POLAND SP. Z O.O.                  |
| Przeznaczenie   | Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe           |
| Rodzaj produktu | Produkt leczniczy                          |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów |

## Opis produktu

**Opis**  
Coldrex Maxigrip to lek, który łagodzi objawy przeziębienia i grypy, takie jak gorączka, dreszcze, ból głowy i katar.

**Dawkowanie**  
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: doustnie 2 tabletki podawać do 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować dawki leku częściej, niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby.

- Skład**
- Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, kofeina, chlorowodorek fenylefryny, wodzian terpinu i kwas askorbowy (witamina C)
  - 1 tabletkę zawiera 500 mg paracetamolu, 25 mg kofeiny, 5 mg chlorowodoru fenylefryny, 20 mg wodzianu terpinu i 30 mg kwasu askorbowego (witamina C) oraz substancje pomocnicze: skrobię kukurydzianą, skrobię rozpuszczalną, talk, kwas stearynowy, powidon, potasu sorbinian, sodu laurylosiarczan, żółty barwnik (E110).

- Przeciwwskazania**
- Nie stosować leku dłużej niż 3 bez konsultacji z lekarzem.
  - Nie należy stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol lub zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa.
  - Nie należy stosować leku u osób z nadwrażliwością na którykolwiek składnik leku, z niewydolnością wątroby lub ciężką niewydolnością nerek, z nadczynnością tarczycy, cukrzycą, z nadciśnieniem tętniczym krwi, z chorobami serca, ze zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym, z rozrostem gruczołu krokowego, z chorobą alkoholową.
  - Preparat jest przeciwwskazany u osób przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, zydowudynę oraz w trakcie przyjmowania inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i w ciągu 2 tygodni po ich zastosowaniu.

- Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
- Nie należy stosować leku w ciąży.
- Nie stosować leku w okresie karmienia piersią.

### Działania niepożądane

Bardzo rzadko (dotyczące mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- Ból głowy.
- Zawroty głowy.
- Bezsenność.
- Nerwowość.
- Zwiększenie ciśnienia tętniczego.
- Nudności i wymioty.

### Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem jeżeli u pacjenta występuje cukrzyca.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

### Producent

Omega Pharma Poland Sp. z o.o. (Perrigo Poland Sp. z o.o.)  
al. Niepodległości 18,  
02-653 Warszawa

## Galeria

