

Coldrex MaxGrip Lek przeciw objawom grypy i przeziębienia 10 sztuk



Cena: 31,38 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	COLDREX
Opakowanie	10 saszetek
Postać	Saszetki
Producent	OMEGA PHARMA POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ból gardła, Ból głowy, Gorączka, Katar
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Coldrex MaxGrip C to lek na przeziębienie, który może być stosowany również w leczeniu pierwszych objawów grypy u osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat. Tabletki zawierają przeciwbólowy i przeciwgorączkowy paracetamol, udrażniającą nos fenylefrynę oraz terpin o działaniu wykrztuśnym. Lek zawiera również witaminę C i pobudzającą kofeinę.

Wskazania

Coldrex MaxGrip C stosuje się w leczeniu typowych objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle gardła, bóle kostne i mięśniowe.

Działanie

Lek Coldrex MaxGrip C w swoim składzie zawiera substancje czynne takie jak paracetamol, chlorowodorek fenylefryny, kofeinę, wodzian terpinu i witaminę C, których połączenie daje wielokierunkowe działanie: przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, obkurczające naczynia krwionośne (zmniejszające katar) oraz wykrztuśne.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doustnie 2 tabletki do 4 razy na dobę.

Nie należy przyjmować dawki leku częściej, niż co 4 godziny na dobę ani nie stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby.

Należy zawsze stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę leku.

Leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Skład

Substancją czynną leku jest paracetamol (Paracetamolum), kofeina (Coffeinum), chlorowodorek fenylefryny (Phenylephrini

hydrochloridum), wodzian terpinu (Terpinum hydratum), kwas askorbowy (Acidum ascorbicum).

1 tabletkę zawiera 500 mg paracetamolu, 25 mg kofeiny, 5 mg chlorowodoru fenylefryny, 20 mg wodzianu terpinu, 30 mg kwasu askorbowego.

Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, skrobia rozpuszczalna, talk, kwas stearynowy, powidom, potasu sorbinian, sodu laurylosiarczan, żółty barwnik (E 110).

Przeciwwskazania

- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, kofeinę, fenylefrynę, wodzian terpinu, witaminę C lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u osób z niewydolnością wątroby lub ciężką niewydolnością nerek,
- u osób z chorobą alkoholową,
- u osób przyjmujących zydowudynę (stosowaną w leczeniu zakażeń wirusem HIV),
- u osób przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) i w ciągu 2 tygodni po ich ostatnim zastosowaniu.
- Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

- ból głowy,
- zawroty głowy,
- bezsenność,
- nerwowość,
- zwiększenie ciśnienia tętniczego,
- nudności i wymioty.

Interakcje

Coldrex MaxGrip C może wchodzić w interakcje z:

- lekami stosowanymi przeciw nudnościom i wymiotom,
- lekami stosowanymi w celu zmniejszenia dużego stężenia cholesterolu we krwi,
- lekami przeciwzakrzepowymi,
- lekami nasennymi,
- lekami stosowanymi w leczeniu depresji, manii),
- lekami stosowanymi w leczeniu alkoholizmu.

Przechowywanie

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia

- Nie stosować z innymi produktami leczniczymi zawierającymi paracetamol i (lub) sympatykomimetykami.
- Lek zawiera paracetamol.
- Lek zawiera kofeinę, należy unikać nadmiernego spożycia kawy, herbaty lub napojów zawierających kofeinę podczas stosowania leku.
- Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku chorób wątroby lub nerek, pacjentów z niedowagą i niedożywionych, pacjentów regularnie spożywających alkohol.
- Lek zawiera żółty barwnik (E110), może powodować reakcje alergiczne.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

