

Contix ZRD 20 mg, 14 tabletek

Cena: 10,29 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	CONTIX
Opakowanie	14 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	PRZEDS. FARMACEUTYCZNE LEK-AM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Hamowanie wydzielania kwasu żołądkowego
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Contix ZRD to lek w postaci tabletek dojelitowych, które zawierają substancję czynną pantoprazol. Przeznaczony jest do krótkotrwałego leczenia objawów choroby refluksowej żołądka u osób dorosłych. Te objawy obejmują pieczenie w klatce piersiowej, które sięga nawet do gardła (zgaga), oraz kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie). Działanie leku polega na blokowaniu enzymu odpowiedzialnego za produkcję kwasu żołądkowego, co prowadzi do zmniejszenia jego ilości w żołądku. Contix ZRD pomaga w łagodzeniu dolegliwości związanych z chorobą refluksową już po pierwszym dniu stosowania, choć nie jest natychmiastowym lekiem przeciwdziałającym objawom refluksu, który polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może spowodować stan zapalny przełyku i ból. Ustąpienie objawów refluksu zazwyczaj obserwuje się po 2-3 dniach stosowania leku.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej żołądka, w tym zgagi i kwaśnego odbijania.

Działanie

Zmniejszenie ilości kwasu żołądkowego.

Dawkowanie

Dorośli: 1 tabletka na dobę o tej samej porze dnia, przed posiłkiem, popijając obficie wodą.

Skład

1 tabletka dojelitowa zawiera:

- substancję czynną: pantoprazol 20mg (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego),
- substancje pomocnicze: rdzeń (skrobia kukurydziana żelowana, sodu stearylofumarat, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon, mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, sodu wodorowęglan) oraz otoczka (alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 3350, talk, kopolimer kwasu metakrylowego typu C, trietylu cytrynian, krzemionka



koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Contix ZRD:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent stosuje inhibitory proteazy wirusa HIV,
- jeśli pacjent nie ukończył 18 roku życia,
- w przypadku ciąży lub karmienia piersią.

Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane: łagodne polipy żołądka.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane: bóle i zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia, zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w obrębie brzucha, wysypka skórna lub pokrzywka, swędzenie skóry, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.
- Rzadko występujące działania niepożądane: zaburzenia lub całkowity brak odczuwania smaku, bóle mięśni, bóle stawów, zwiększone stężenie bilirubiny.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: zaburzenia orientacji, zmniejszenie płytek krwi (tendencja do krwawień), nieprawidłowe zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek.

Ostrzeżenia

- Lek nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.
- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić z lekarzem jeśli: pacjent jest leczony z powodu zgagi, przebył chorobę wrzodową żołądka lub przeszedł operację żołądka, u pacjenta występowała reakcja skórna po zastosowaniu podobnego leku.
- Nie stosować tego leku dłużej niż 4 tygodnie.
- Długotrwałe stosowanie leku może wiązać się z: ograniczonym wchłanianiem witaminy B12, zmniejszeniem stężenia magnezu we krwi.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu

Producent

LEK-AM
Ostrzykowitzna 14A
Zakroczym