

Contractubex 50 IU + 100 mg + 10 mg Żel 50 g

Cena: 73,41 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	CONTRACTUBEX
Opakowanie	50 g (tub.)
Postać	Żel
Producent	MERZ PHARMACEUTICALS GMBH
Przeznaczenie	Blizny
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Contractubex w formie żelu to lek przeznaczony do stosowania na blizny, charakteryzujący się właściwościami wygładzającymi i rozluźniającymi tkankę blizny po pełnym zagojeniu rany. Produkt ten zawiera trzy składniki aktywne: heparynę, płynny wyciąg z cebuli oraz alantoinę, które współdziałają ze sobą, wzmacniając swoje działanie.

Wskazania

Blizny ograniczające ruch, powiększone (przerostowe, obrzmiałe, o kształcie bliznowca), nieestetyczne blizny pooperacyjne, blizny po amputacjach, blizny pooparzeniowe i powypadkowe, przykurcze np. palców (przykurcz Dupuytrena), przykurcze ścięgien spowodowane urazami oraz kurczeniem się blizny.

Działanie

Antyproliferacyjne, przeciwzapalne, wygładzające oraz rozluźniające tkankę blizny.

Dawkowanie

Zwykle stosowane dawkowanie Contactubex dla dorosłych to kilkukrotne w ciągu dnia, delikatne wcieranie żelu w skórę lub tkankę blizny. W przypadku blizn zadawnionych i stwardniałych należy nałożyć opatrunek z żelem na noc.

Skład

1 g żelu zawiera:

- substancje czynne: heparyna sodowa (Heparinum natricum) 50 IU, wyciąg płynny z cebuli (Allii cepae extractum) 100 mg, alantoina (Allantoinum) 10 mg,
- etanol, kwas sorbowy (E 200), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), guma ksantan, makrogol 200, substancja poprawiająca zapach Perfume oil Fragrance 30263773 Rosae (zawierająca cytronellol, geraniol, alkohol benzylowy, cytral i linalol), woda oczyszczona.



Przeciwwskazania

Nie stosować Contractubex w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Przeciwwskazaniami do zastosowania żelu są: niewyleczone rany, blizny obejmujące duże obszary skóry, uszkodzona skóra, aplikacja na błony śluzowe.

Działania niepożądane

- Śwędzenie,
- Silne zaczerwienienie,
- Rozszerzenie naczyń włosowatych,
- Pogłębienie blizny.

Ostrzeżenia

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 6 miesięcy.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstrasse 100
60318 Frankfurt/Main, Niemcy

Galeria

