

CRP-Screen, szybki test do wykrywania poziomu białka C-reaktywnego, 1 sztuka

Cena: 39,51 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	LABHOME
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	ZBADAJSIE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

CRP-Screen to wyrób medyczny w postaci testu do uruchomienia dostępnego C-reaktywnego z użyciem krwi pobranej z nakłucia palca. Badanie w 4 zakresach, objętych w diagnostyce opieki i stanów chorobowych. Test pozwala na infekcję środowiska biologicznego lub bakteryjne, co może pomóc w rozwiązaniu o potrzebie zastosowania praktycznego. Wynik na poziomie laboratorium można uzyskać w warunkach domowych w ciągu 5 minut.

Wskazania

Test CRP-Screen wykonuje się w diagnostyce infekcji i stanów zapalnych. Umożliwia pomoc w szybkim rozpoznaniu, czy w organizmie toczy się infekcja bądź stan zapalny, a jeśli tak- to o jakim podłożu. Test CRP w codziennym zastosowaniu wykonuje się w przypadku:

- infekcji dróg oddechowych- kaszel, duszności, trudność w oddychaniu,
- infekcji gardła- ostry ból, obrzęk, trudności w przełykaniu, zaczerwienienie- mogą być spowodowane infekcją wirusową, ale również zakażeniem bakteryjnym np. angina,
- objawów grypy i przeziębienie- katar, gorączka, dreszcze, bóle głowy i mięśni, osłabienie,
- wykrywania poważnych infekcji bakteryjnych u dzieci- zapalenie płuc i oskrzeli,
- rozpoznania infekcji pooperacyjnych po ekstrakcji zęba,
- zatrucia- biegunka, wymioty, gorączka, mogą być spowodowane zarówno zatruciem pokarmowym, jak również infekcją żołądkowo-jelitową.

Przeciwwskazania

- Białko CRP to tzw. marker zmian zapalnych w organizmie. Zmiany zapalne powodujące wzrost poziomu CRP w krwi mogą być związane z miażdżycą naczyń, chorobami jelit, uszkodzeniem tkanek i narządów, obecnością infekcji wirusowej bądź



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

bakteryjnej.

- Wysoki poziom CRP (40-100 mg/l) lub wyższy niż 100 mg/l może świadczyć o infekcji bakteryjnej i zasadności zastosowania antybiotyku. Wskazana jest pilna konsultacja z lekarzem.

Producent

VEDA.LAB

Rue de l'Expansion

61000 Cerise, France