

Cyclo 3 Fort, 150 mg+150 mg+100 mg, kapsułki twarde, 30 kapsułek

Cena: 34,43 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 kapsułek
Postać	Kapsułki twarde
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne, Przeciwozrętkowe, Uszczelniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Cyclo 3 Fort to lek wspierający elastyczność naczyń żylnych i chroniący naczynia krwionośne, przeznaczony do stosowania w przypadku niewydolności żylnych (uczucie ciężkich nóg) oraz wspomagająco przy hemoroidach.

Wskazania

- Leczenie objawowe niewydolności naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból),
- Leczenie pomocnicze w dolegliwościach żyłaków odbytu.

Działanie

Cyclo 3 Fort zawiera 3 substancje czynne, które wpływają na elastyczność naczyń żylnych. Lek ten działa tonizująco i ochraniająco na naczynia krwionośne (następuje poprawa napięcia ścian naczyń żylnych, odporność naczyń włosowatych, obniża przepuszczalność naczyń krwionośnych).

Dawkowanie

- Leczenie objawowe niewydolności naczyń żylnych: 2-3 kapsułki dziennie w schemacie 1 kapsułka rano i 1 kapsułka wieczorem lub 2 kapsułki rano i 1 kapsułka wieczorem.
- Leczenie pomocnicze w żyłakach odbytu: 4-5 kapsułek dziennie w schemacie 2 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem lub 3 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem.

Skład

- Substancjami czynnymi są: suchy wyciąg z ruszczyka kolczastego (*Ruscus aculeatus* L., rhizoma), hesperydyna, kwas

askorbowy (witamina C).

- 1 kapsułka twarda zawiera 150 mg suchego wyciągu z kłącza ruszczyka kolczastego (5 – 7,5 :1), ekstrahent: etanol 85% (v/v); 150 mg hesperydyny metylochalkonu; 100 mg kwasu askorbowego (witaminy C).
- Substancje pomocnicze: krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, stearynian magnezu, talk, glikol polioksyetylenowy (Macrogol) 6000; otoczka kapsułki: denko (koloru żółtego) - żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa FCF (E 110), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna; wieczko (koloru pomarańczowego) - żółcień pomarańczowa FCF (E 110), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cyclo 3 Fort:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne - wyciąg z ruszczyka, hesperydyny metylochalkon, kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma zaburzenia gospodarki żelazowej (w leku obecny jest kwas askorbowy).

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- biegunka,
- ból brzucha.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- bezsenność,
- niestrawność, mdłości,
- rumień, świąd,
- skurcze mięśni, bóle kończyn (rąk / nóg).

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- zawroty głowy,
- uczucie zimna w kończynach,
- ból naczyń żylnych (wrażliwość naczyń żylnych),
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
- wzrost aktywności enzymu wątrobowego (aminotransferazy alaninowej).

Częstość nieznaną:

- ból żołądka,
- pokrzywka.

Ostrzeżenia

- Jeśli podczas stosowania pojawi się stan zapalny skóry, owrzodzenia skórne - należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli wystąpi obrzęk 1 lub obu kończyn dolnych, niewydolność serca / nerek należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli wystąpi biegunka, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku stosowania leku w zaburzeniach krążenia żylnego - jeśli po 2 tygodniach pojawił się dyskomfort lub kruchość naczyń, należy skontaktować się z lekarzem.
- Lek zawiera żółcień pomarańczową FCF (E 110), która może powodować reakcje alergiczne.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

PIERRE FABRE
Belwederska 20/22
Warszawa