

Cyclo 3 Fort, 30 kapsułek



Cena: 26,84 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	CYCLO 3 FORT
Opakowanie	30 kapsułek
Postać	Kapsułka
Producent	PIERRE FABRE MEDICAMENT
Przeznaczenie	Hemoroidy, Obrzęk, Żylaki
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Cyclo 3 Fort to lek z grupy preparatów wpływających na urządzenia żylnie w układzie krążenia. Ten lek działa na naczynia krwionośne, wzmacniając ich strukturalne, zapewniając dodatkowe zasilanie włosowatych i odprowadzanie wydajności zasilania. Cyclo 3 Fort jest następstwem w celu łagodzenia skutków związanych z chorobami żylnymi, takimi jak przyjaciele ciężkości w kończynach dolnych oraz ból. Ponadto, lek może być stosowany jako pomoc przy dolegliwościach związanych z żylakami odbytu.

Wskazania

Niewydolność naczyń żylnych i limfatycznych oraz dolegliwości bólowe związane z żylakami odbytu.

Działanie

Ochronne na naczynia krwionośne, zmniejszające przepuszczalność naczyń włosowatych.

Dawkowanie

- Leczenie objawowe niewydolności naczyń żylnych: 2-3 kapsułki dziennie w schemacie 1 kapsułka rano i 1 kapsułka wieczorem lub 2 kapsułki rano i 1 kapsułka wieczorem.
- Leczenie pomocnicze w żylakach odbytu: 4-5 kapsułek dziennie w schemacie 2 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem lub 3 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem.

Skład

1 kapsułka zawiera:

- substancje czynne: 150 mg suchego wyciągu z kłącza ruszczyka kolczastego 5-7,5;1 (ekstrahent: etanol 85% v/v), 150 mg metylochalkonu hesperydyny i 100 mg kwasu askorbowego,
- substancje pomocnicze: talk, stearynian magnezu, krzemu koloidalny dwutlenek bezwodny, glikol polioksyetylenowy (Macrogol) 6000, denko (koloru żółtego) - żółcień chinolinowa (E104), żółcień pomarańczowa (E110), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna;

wieczko (koloru pomarańczowego) - żółcień pomarańczowa (E110), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna.

Przeciwwskazania

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne - wyciąg z ruszczyka, hesperydyny metylochalcon, kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma zaburzenia gospodarki żelazowej (w leku obecny jest kwas askorbowy).

Działania niepożądane

- biegunka,
- ból brzucha.
- bezsenność,
- niestrawność, mdłości,
- rumień, świąd,

Ostrzeżenia

- Jeśli podczas stosowania pojawi się stan zapalny skóry, owrzodzenia skórne - należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli wystąpi obrzęk 1 lub obu kończyn dolnych, niewydolność serca / nerek należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli wystąpi biegunka, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku stosowania leku w zaburzeniach krążenia żylnego - jeśli po 2 tygodniach pojawił się dyskomfort lub kruchość naczyń, należy skontaktować się z lekarzem.
- Lek zawiera żółcień pomarańczową FCF (E 110), która może powodować reakcje alergiczne.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.