

DaFurag max Tabletki 15 sztuk

Cena: 7,83 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	15 tabl.
Postać	tabl.
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu

Opis

DaFurag max to produkt leczniczy stosowany w zakażeniach dolnych dróg moczowych.

Wskazania

Lek Dafurag max stosuje się w zakażeniu dolnych dróg moczowych.

Działanie

Dafurag max jest lekiem przeciwbakteryjnym, zawierającym substancję czynną - furazydynę (dawniej zwaną furagimą), która jest pochodną nitrofuranu. Furazydyna hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka przez dorosłych i młodzież powyżej 15 roku życia:

Pierwszy dzień leczenia: 1 tabletkę 4 razy na dobę.

Następne dni leczenia: 1 tabletkę 3 razy na dobę.

- Lek przyjmować doustnie, najlepiej podczas posiłków zawierających białko.
- Lek stosuje się przez 7-8 dni.
- Jeśli objawy nasilią się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza.

Skład

Substancją czynną leku jest furazydyna (Furazidinum), dawniej zwana furagimą.

1 tabletkę zawiera 100 mg furaginy.

Substancje pomocnicze: mannitol, laktoza jednowodna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), stearynian magnezu.

Przeciwwskazania

- jeśli pacjent ma uczulenie na furaginę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na pochodne nitrofuranu,
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek (skąpomocz, bezmocz),
- jeśli pacjent ma rozpoznaną polineuropatię, np. cukrzycową (uszkodzenie nerwów spowodowane podwyższonym stężeniem cukru we krwi),
- jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej - lek może spowodować rozpad czerwonych krwinek (hemolizę), co z kolei może być przyczyną rozwoju niedokrwistości hemolitycznej (anemia spowodowana nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych).

Działania niepożądane

- nudności, nadmierne oddawanie gazów,
- bóle głowy,
- objawy polekowego zapalenia wątroby,
- zawroty głowy, senność,
- zaburzenia widzenia,
- uszkodzenie nerwów obwodowych,
- wymioty,
- zaparcia, biegunka, objawy niestrawności, bóle brzucha,
- zapalenie ślinianek,
- zapalenie trzustki,
- łysienie,
- zakażenia drobnoustrojami opornymi na furazydynę,
- gorączka, dreszcze, złe samopoczucie,
- sine zabarwienie skóry o odcieniu czekoladowobrązowym,
- niedokrwistość megaloblastyczna (powstała w wyniku niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego) lub niedokrwistość hemolityczna (spowodowana szybkim rozpadem krwinek czerwonych) – może wystąpić u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej.

Interakcje

Dafurag max może wchodzić w interakcje z następującymi lekami:

- pochodne chinolonu (np. kwas nalidyksowy – antybiotyk) – furazydyna może hamować ich działanie przeciwbakteryjne,
- probenecyd i sulfipirazon (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej) – mogą osłabić działanie furazydyny oraz zwiększyć jej toksyczność,
- antybiotyki z grupy aminoglikozydów i tetracyklin – podawane razem z furazydyną nasilają jej działanie przeciwbakteryjne,
- chloramfenikol i rystomycyna (antybiotyki) – zwiększają toksyczne działanie furazydyny,
- leki zobojętniające sok żołądkowy, które zawierają trójkrzemian magnezu, ponieważ zmniejszają wchłanianie furazydyny, co osłabia jej działanie przeciwbakteryjne,
- witaminy z grupy B – zwiększają wchłanianie pochodnych nitrofuranu.

Przechowywanie

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia

- Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, wątroby, zaburzenia układu nerwowego, niedokrwistość, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witamin z grupy B, niedobór kwasu foliowego lub choroby płuc to stosowanie leku należy omówić z lekarzem.
- W przypadku długotrwałego stosowania leku może być konieczne badanie krwi, w celu skontrolowania liczby białych krwinek oraz czynności nerek i wątroby.
- Lek Dafurag max zawiera laktozę

Galeria

