

Deflegmin 0,75% krople 50 ml

Cena: 17,30 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DEFLEGMIN
Opakowanie	50 ml
Postać	Krople
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Przeznaczenie	Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

Deflegmin Baby to lek mukolityczny dostępny w postaci kropli doustnych, którego aktywnym składnikiem jest chlorowoderek ambroksolu. Działa poprzez zwiększanie produkcji śluzu w drogach oddechowych oraz poprawę jego transportu, co skutkuje ułatwieniem procesu odkrztuszania i łagodzeniem kaszlu. Lek jest zazwyczaj stosowany w przypadku chorób płuc, szczególnie ostrych i przewlekłych, które towarzyszy kaszel i trudności w odkrztuszaniu.

Wskazania

Krople doustne Deflegmin Baby 7,5 mg/ml stosuje się u osób powyżej 1. roku życia:

- w ostrych i przewlekłych chorobach płuc i oskrzeli, w celu ułatwienia odkrztuszania wydzieliny z dróg oddechowych.

Działanie

Zwiększanie wydzielania i poprawia transportu śluzu w drogach oddechowych, ułatwianie odkrztuszania, łagodzenie kaszlu.

Dawkowanie

- Dorosli i dzieci powyżej 12. roku życia: 4 ml (100 kropli), 3 razy na dobę, przez 2-3 dni. Kolejne dni: 4 ml, 2 razy na dobę.
- Dzieci od 6 do 12. roku życia: 2 ml (50 kropli), 2-3 razy na dobę.
- Dzieci od 2. do 6. roku życia: 1 ml (25 kropli), 3 razy na dobę.
- Dzieci od 1. do 2. roku życia: 1 ml (25 kropli) 2 razy na dobę.

Skład

1 ml roztworu (25 kropli) zawiera:

- substancję czynną: chlorowodorku ambroksol (Ambroxoli hydrochloridum) 7,5 mg,



- substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Deflegmin Baby:

- w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- bezpośrednio przed snem.

Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane: zaburzenia smaku, osłabienie czucia w jamie ustnej i gardle, nudności.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane: biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha, suchość błon śluzowych jamy ustnej.

Ostrzeżenia

- Jeśli po upływie 4 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
- Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli występują: choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, zaburzona czynność nerek i wątroby, zmiany skórne / na błonach śluzowych, osłabiony odruch kaszlowy, astma oskrzelowa.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Producent

Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Dublin 24, D24PPT3 Irlandia