

Deflegmin Junior 15 mg/ 5 ml, syrop, 120 ml



Cena: 19,96 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DEFLEGMIN
Opakowanie	120 ml
Postać	Syrop
Producent	ICN POLFA RZESZÓW S.A.
Przeznaczenie	Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Deflegmin Junior, dostępny w postaci syropu, to lek, który działa poprzez rozrzedzanie wydzielin górnych dróg oddechowych. Wzmacnia produkcję śluzu w tych obszarach i ułatwia jego transport, co prowadzi do łatwiejszego odkrztuszania i łagodzenia kaszlu.

Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby płuc oraz oskrzeli przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych.

Działanie

Zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych i poprawia jego transport, a dzięki temu ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: początkowo, przez 2 do 3 dni, 10ml syropu 3 razy na dobę, następnie dawkę należy stosować 2 razy na dobę;

- dzieci w wieku od 6. do 12. lat: 5ml syropu 2 do 3 razy na dobę;
- dzieci w wieku od 2. do 6. lat: 2,5ml syropu 3 razy na dobę;
- dzieci w wieku od 1. do 2 lat: 2,5ml syropu 2 razy na dobę.

Skład

5ml syropu zawiera substancję czynną 15mg ambroksolu chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: sorbitol roztwór, glicerol, glikol propylenowy, sodu benzoatan, woda oczyszczona, aromat maskujący, kwas solny 10% (do ustalenia pH).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Deflegmin Junior:

- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek ambroksolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku



- bezpośrednio przed snem.

Ostrzeżenia

- Przechowywanie w temperaturze 25oC.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Chronić od światła.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku Deflegmin Junior należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, astma oskrzelowa, zaburzenia czynności wątroby lub nerek, jeśli odruch kaszlowy jest osłabiony lub występują zaburzenia oczyszczania rzęskowego oskrzeli.

Producent

Bausch Health Ireland Limited
Lake Drive Citywest Business
3013 Campus Dublin 24, D24PPT3 Irlandia