

## Deflegmin retard 75 mg, 10 kapsułek



Cena: 19,66 zł

### Opis słownikowy

Część ciała	Drogi oddechowe
Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DEFLEGMIN
Opakowanie	10 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Przeznaczenie	Kaszel mokry, Zapalenie oskrzeli
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

### Opis produktu

#### Opis

**Deflegmin** to lek o działaniu mukolitycznym, który pomaga w rozrzedzeniu i usunięciu śluzu z dróg oddechowych. Jego substancją czynną jest ambroksol w postaci chlorowodoru, który stymuluje wydzielanie śluzu oraz zmniejsza jego lepkość. Dzięki temu lek ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel, przyczyniając się do oczyszczenia dróg oddechowych.

#### Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby płuc oraz oskrzeli przebiegające z utrudnionym odkrztuszaniem lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych.

#### Działanie

Mukolityczne (zwiększenie wydzielania śluzu oraz zmniejszenie jego lepkości w drogach oddechowych).

#### Dawkowanie

- Dorośli: 1 kapsułka na dobę, rano lub wieczorem.
- Lek należy przyjmować po posiłku, popijając niewielką ilością płynu.

#### Skład

1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera:

- substancję czynną: ambroksolu chlorowodorek 75mg,
- substancje pomocnicze: sacharoza ziarenka, skrobia kukurydziana, szelak, powidon, talk; skład kapsułki żelatynowej: erytrozyna (E 127), tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132), żelatyna.

#### Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Deflegmin w przypadku wystąpienia uczulenia na ambroksol chlorowoderek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Ponadto, lek w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

#### Działania niepożądane

- Ciężkie działania niepożądane o częstości nieznanej, takie jak reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd.
- Ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry, takie jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica.
- Często występujące nudności.
- Niezbyt często występujące wymioty, biegunka, niestrawność i ból brzucha.
- Rzadko występujące reakcje nadwrażliwości, wysypka i pokrzywka.

#### Interakcje

Przed rozpoczęciem stosowania leku Deflegmin należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich obecnie przyjmowanych lekach oraz tych, które były przyjmowane ostatnio. Istnieje możliwość interakcji lekowej między ambroksolem (substancją czynną w Deflegminie) a niektórymi antybiotykami, takimi jak amoksycylina, cefuroksym, erytromycyna i doksycyklina. Ambroksol może zwiększać stężenie tych antybiotyków w mięszu płucnym.

#### Przechowywanie

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

#### Ostrzeżenia

Nie należy stosować kapsułek o przedłużonym uwalnianiu leku Deflegmin u dzieci i młodzieży. Jeżeli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią lub przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje dziecko, powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku. Nie zaleca się stosowania leku w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, oraz podczas karmienia piersią, ponieważ ambroksol przenika do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu ambroksolu na płodność.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.