

# Dentinox N 15 % + 0,34 % + 0,32 % Żel do stosowania na dziąsła 10 g

Cena: 24,27 zł



## Opis słownikowy

|                 |   |
|-----------------|---|
| Dla kogo        | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn                         |
| Marka           | DENTINOX  |
| Opakowanie      | 10 g (tub.)   |
| Postać          | Żel do stosowania na dziąsła                                  |
| Producent       | DENTINOX GESELLSCHAFT FÜR PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE           |
| Przeznaczenie   | Dezynfekujące (odkażające), Łagodzące (kojące), Znieczulające |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty   |
| Wiek            | Dla dziecka   |

## Opis produktu

### Opis

Żel **Dentinox N** przeznaczony jest do łagodzenia ostrych dolegliwości bólowych oraz stanów zapalnych dziąseł, związanych z procesem wyrzynania się zębów. Preparat działa łagodząco i jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania w przypadku tych dolegliwości.

### Wskazania

- Ząbkowanie niemowląt, stany zapalne dziąseł,
- Lek może być również stosowany podczas wyrzynania się zębów mądrości.

### Działanie

Produkt łagodzi objawy związane z ząbkowaniem. Łagodzi podrażnienia dziąseł i dolegliwości bólowe.

### Dawkowanie

- Lek stosować krótkotrwale w przypadku pojawienia się ostrych objawów ząbkowania.
- Smarować dziąsła niewielką ilością żelu (ok. 0,5 cm) przy pomocy czystego palca lub bawełnianego patyczka i lekko wmasować.
- W przypadku nakładania żelu palcem, należy dokładnie umyć ręce przed użyciem i po użyciu żelu.
- Powtarzać nie częściej niż 2-3 razy dziennie, zwłaszcza po jedzeniu lub po wykonaniu zabiegów higienicznych w jamie ustnej.
- Jeśli zmiany na dziąsłach utrzymują się dłużej niż tydzień lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.

### Skład

10 g żelu zawiera:

- substancje czynne: Chamomillae tinctura 1500 mg, ekstrahent etanol 70% (v/v) Lidocaini hydrochloridum 34 mg, Macrogoli aether laurilicum 32 mg;
- substancje pomocnicze: karbomer (934 P), lewomentol, wersenian dwusodowy, sodu wodorotlenek 10%, polisorbat 20, glikol propylenowy, sól sodowa

sacharyny, sorbitol ciekły niekryształizujący, woda oczyszczona, ksylitol.

- Zawartość etanolu w produkcie max 9,5%.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dentinox N:

- w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku nietolerancji rumianku lub innych roślin z rodziny Asteraceae (w tym reakcji krzyżowej), reakcji nadwrażliwości na rumianek (np. kontaktowe zapalenie skóry),
- w przypadku nietolerancji lidokainy lub podobnych środków miejscowo znieczulających (typu amidowego),
- w przypadku nietolerancji fruktozy.

### Ostrzeżenia

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
- Podczas stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami.
- W przypadku pojawienia się silniejszego zaczerwienienia, obrzęku, reakcji nadwrażliwości, należy skontaktować się z lekarzem.
- Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować miejscowe podrażnienie.
- Lek zawiera sorbitol, który nie powinien być stosowany w nietolerancji fruktozy.
- Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

### Producent

DENTINOX

### Galeria

