

Dentinox N, 15% + 0,34% + 0,32%, żel na dziąsła, 10 g

Cena: 29,26 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Opakowanie	10 g (tub.)
Postać	Żel do stosowania na dziąsła
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwzapalne, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka

Opis produktu

Opis

Dentinox N to lek stosowany w przypadku podrażnienia dziąseł i bólów związanych z ząbkowaniem, tj. wyrzynaniem się zębów mlecznych.

Wskazania

Bolesne wyrzynanie się zębów mlecznych z objawami podrażnienia i bólu.

Działanie

Dentinox N łagodzi objawy związane z ząbkowaniem - łagodzi podrażnienie dziąseł i dolegliwości bólowe.

Dawkowanie

Lek stosować 2-3 razy dziennie. Niewielką ilość żelu (wielkość ziarnka grochu) wmasować w dziąsła - palcem lub patyczkiem bawełnianym. Żel aplikować szczególnie po jedzeniu lub po zabiegach higienicznych w jamie ustnej przed pójściem spać.

Skład

- Substancjami czynnymi są: nalewka z rumianku (*Chamomillae tinctura*), lidokaina (*Lidocaini hydrochloridum*), makrogol (*Macrogoli aether laurilicum*).
- Substancje pomocnicze: karbomer (934 P), lewomentol, wersenian dwusodowy, sodu wodorotlenek 10%, polisorbit 20, glikol propylenowy, sól sodowa sacharyny, sorbitol ciekły niekryształujący, woda oczyszczona, ksylitol.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dentinox N:

- w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku nietolerancji rumianku lub innych roślin z rodziny *Asteraceae* (w tym reakcji krzyżowej), reakcji nadwrażliwości na rumianek (np. kontaktowe zapalenie skóry),
- w przypadku nietolerancji lidokainy lub podobnych środków miejscowo znieczulających (typu amidowego),



- w przypadku nietolerancji fruktozy.

Ostrzeżenia

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
- Podczas stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami.
- W przypadku pojawienia się silniejszego zaczerwienienia, obrzęku, reakcji nadwrażliwości, należy skontaktować się z lekarzem.
- Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować miejscowe podrażnienie.
- Lek zawiera sorbitol, który nie powinien być stosowany w nietolerancji fruktozy.
- Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
DENTINOX