

DexaCaps, kapsułki twarde, 10 kapsułek

Cena: 16,36 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwkaszlowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

DexaCaps to lek dostępny w formie kapsułek, przeznaczony do łagodzenia suchego, uporczywego kaszlu, który często towarzyszy infekcjom górnych dróg oddechowych.

Wskazania

DexaCaps stosowany jest w stanach męczącego, suchego kaszlu różnego pochodzenia, niezwiązanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych.

Działanie

Dekstrometorfan jest środkiem przedkaszlowym. Jego działanie polega na hamowaniu ośrodka kaszlu w ośrodkowym układzie nerwowym, dzięki czemu zmniejsza się częstotliwość ataków suchego kaszlu.

Dawkowanie

Zwykle stosowana dawka dla młodzieży powyżej 12 lat i dorosłych to 1 kapsułka 3 razy na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi są: dekstrometorfanu bromowodorek (Dextromethorphan hydrobromidum), wyciąg suchy z kwiatostanu lipy (Tiliae flos), wyciąg suchy z liścia melisy (Melissae folium).
- Substancje pomocnicze: skrobia żelowana kukurydziana, celuloza mikrokryształiczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka kapsułki: żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku DexaCaps:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- w przypadku kaszlu z dużą ilością wydzieliny;

- u pacjentów z astmą oskrzelową;
- u pacjentów z ciężką chorobą wątroby;
- u pacjentów z niewydolnością oddechową lub ryzykiem jej wystąpienia;
- jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje inhibitory monoaminooksydaz (MAO) i w okresie do 14 dni po ich odstawieniu;
- u pacjentów przyjmujących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI);
- u pacjentów przyjmujących leki mukolityczne (rozrzedzające śluz w drogach oddechowych).

Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

- senność.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- reakcje alergiczne ze strony skóry i układu oddechowego,
- pobudzenie, splątanie, z
- zawroty głowy, drgawki,
- depresja oddechowa,
- wymioty, nudności, biegunka,
- wysypka.

Ostrzeżenia

- Odnotowano przypadki nadużywania leków zawierających dekstrometorfan. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku stosowania tego leku u młodzieży i młodych osób dorosłych, jak również u pacjentów, u których odnotowano w wywiadzie nadużywanie produktów leczniczych lub substancji psychoaktywnych.
- W przypadku przewlekłego lub utrzymującego się kaszlu przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem. Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni, pacjent ma nawracający kaszel lub kaszel z towarzyszącą gorączką, wysypką lub uporczywe bóle głowy, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Mogą to być objawy poważnej choroby.
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze do 25°C.
- Chronić od wilgoci.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Producent

HERBAPOL LUBLIN
Diamantowa 25
Lublin

Galeria



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

DEX/2024/477



DEX/2024/477