

Dexak SL granulat do sporządzania roztworu doustnego 25mg x 10 saszetek

Cena: 11,39 zł



Opis słownikowy

| | |
|-----------------|---|
| Dla kogo | Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Marka | DEXAK |
| Opakowanie | 10 saszetek |
| Postać | granulki |
| Producent | DELFARMA SP. Z O.O. |
| Przeznaczenie | Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty |
| Wiek | Dla dorosłych, Dla seniorów |

Opis produktu

Opis

Dexak SL to dostępny bez recepty lek przeznaczony do krótkotrwałego, objawowego łagodzenia ostrego bólu o umiarkowanym nasileniu. Każda saszetka zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci deksketoprofenu z trometamolem w postaci granulatu do przygotowania roztworu doustnego.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawowe ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. ostrego bólu mięśni i stawów, bolesnego miesiączkowania oraz bólu zębów.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Dorośli: zalecana dawka wynosi 1 saszetka (25 mg) co 8 godzin, co najmniej 30 minut przed posiłkiem.

Skład

1 saszetka granulatu do sporządzania roztworu doustnego zawiera:

- substancja czynna: deksketoprofen 25 mg w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem,
- substancje pomocnicze: amonu glicyryzynian, neohesperydylo-dihydrochalkon, żółcień chinolinowa (E 104), aromat cytrynowy, sacharoza z krzemionką koloidalną uwodnioną.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dexak SL:

- jeśli pacjent ma uczulenia na deksketoprofen lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
- jeżeli u pacjenta występują przewlekłe problemy trawienne,
- jeżeli pacjent jest w stanie ciężkiego odwodnienia z powodu wymiotów, biegunki lub niewystarczającej ilości przyjętych płynów.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane:

- nudności i (lub) wymioty
- bóle brzucha,
- biegunka,
- niestrawność.

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

- zawroty głowy,
- senność,
- zaburzenia snu,
- nerwowość,
- bóle głowy,
- kołatanie serca,
- zaczerwienienie twarzy,
- wzdęcia,
- wysypka,
- zmęczenie,
- odczuwanie gorączki i dreszczy,
- złe samopoczucie.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):

- choroba wrzodowa żołądka,
- omdlenia,
- nadciśnienie tętnicze,
- gromadzenie wody w kończynach i obrzęki obwodowe,
- utrata apetytu,
- zwiększone pocenie się,
- ból pleców,
- zwiększone oddawanie moczu,
- zaburzenia miesiączkowania.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane:

- owrzodzenia skóry, ust, oczu i okolic narządów płciowych,
- obrzęk twarzy lub obrzęk warg i gardła,
- duszność spowodowana zęženiem dróg oddechowych,
- obniżone ciśnienie krwi,
- reakcje nadwrażliwości skóry,
- swędzenie,
- nadwrażliwość skóry na światło.

Ostrzeżenia

- Lek Dexak SL zawiera sacharozę.
- Jeśli u pacjenta występuje alergia lub jeśli u pacjenta występowały problemy z alergią w przeszłości, powinni przed rozpoczęciem stosowania leku Dexak SL omówić to z lekarzem.
- Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, wątroby lub serca jak również zatrzymywanie płynów, powinni przed rozpoczęciem stosowania leku Dexak SL omówić to z lekarzem.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Jeżeli u pacjenta występują lub występowały inne choroby żołądka lub jelit, powinnien przed rozpoczęciem stosowania leku Dexak SL omówić to z lekarzem.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
BERLIN CHEMIE AG
Cybernetyki 7 B
Warszawa