

DexaPico, (1625 mg + 6,5 mg)/5ml, syrop, 115 ml



Cena: 29,44 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	115 ml
Postać	Syrop
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Łagodzące, Przeciwkaszlowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

DexaPico to syrop przeciwkaszlowy stworzony z myślą o dzieciach. Zawiera dekstrometorfanu bromowoderek, który działa hamująco na kaszel, oraz ekstrakt z kwiatów lipy, znany ze swoich właściwości łagodzących i kojących podrażnienia gardła.

Wskazania

Dexapico stosuje się w stanach męczącego, suchego kaszlu różnego pochodzenia, ale niezwiązanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych.

Dawkowanie

Zwykle zalecana dawka wynosi:

- dla dzieci w wieku 2 - 6 lat: 3 razy dziennie po 2,5 ml syropu,
- dla dzieci w wieku 6-12 lat: 3 razy dziennie po 5 ml syropu,
- młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 3 razy dziennie po 15 ml syropu.

Skład

- Substancjami czynnymi są: wyciąg wodny z kwiatostanu lipy (*Tiliae inflorescentiae extractum aquosum*) i bromowoderek dekstrometorfanu (*Dextromethorphan hydrobromidum*).
- 100 g syropu zawiera: wyciąg wodny z kwiatostanu lipy (1:5) 25 g i dekstrometorfanu bromowoderek 0,1 g.
- Substancje pomocnicze: sacharoza, zagęszczony sok aroniowy 65%, kwas cytrynowy jednowodny, sodu benzoosan, potasu sorbinian, aromat malinowy 7111, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować DexaPico:

- jeśli pacjent jest uczulony na którykolwiek ze składników leku
- w przypadku kaszlu z dużą ilością wydzieliny,
- jeśli pacjent choruje na astmę oskrzelową,
- u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową lub ryzykiem wystąpienia jej,
- w przypadku ciężkich schorzeń wątroby,
- przy jednoczesnym przyjmowaniu i w przebiegu 14 dni od odstawienia inhibitorów monoaminoooksydazy (MAO),
- jeśli pacjent stosuje selektywne inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny (SSRI),
- w przypadku stosowania leków mukolitycznych (rozrzedzających śluz w drogach oddechowych).

Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

- senność

Częstość nieznana:

- pobudzenie, splątanie;
- zawroty głowy, drgawki;
- depresja oddechowa; wymioty, nudności, biegunka,
- wysypka.

Ostrzeżenia

- Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.
- Produkt zawiera sacharozę (3,9 g w 5 ml syropu), należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- W przypadku przewlekłego lub utrzymującego się kaszlu przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność.
- Należy zachować ostrożność u pacjentów z powolnym metabolizmem CYP2D6 lub stosujących jednocześnie inhibitory CYP2D6

Producent

HERBAPOL LUBLIN
Diamantowa 25
Lublin

Galeria

