

Diclofenac APTEO MED żel 10mg/g, 100g

Cena: 11,12 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	100 g (tub.)
Postać	Żel
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 14 lat

Opis produktu

Opis

Diclofenac APTEO MED to bezbarwny żel stosowany poprzez wcieranie w skórę, który wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: 14 dni w przypadku urazów mięśni i stawów (skręcenia, nadwyrężenia lub stłuczenia) i zapalenia ścięgien od 2 do 4 g leku Diclofenac APTEO MED
- Dorośli (w wieku powyżej 18 lat): 21 dni w przypadku bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów, o ile lekarz nie zaleci inaczej

od 2 do 4 g leku Diclofenac APTEO MED

Skład

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy. Jeden gram leku zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). Pozostałe składniki leku to: glikol propylenowy, sodu wodorotlenek, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, karbomer, hydroksyetyloceluloza, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na diklofenak lub glikol propylenowy, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- Jeśli u pacjenta występują objawy nadwrażliwości na lek takie jak: sapanie lub skrócenie oddechu (astma), wysypka skórna z pęcherzami lub pokrzywka, obrzęk twarzy lub języka, zapalenie błony śluzowej nosa (katar),
- Jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa (np. wysypka, trudności w oddychaniu lub napad kaszlu) po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen albo innych leków używanych w leczeniu bólu stawów i mięśni,

Działania niepożądane

- Często: wysypka skórna, świąd, zaczerwienienie lub pieczenie skóry.
- Bardzo rzadko: zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne. Objawami nadwrażliwości są oparzenia słoneczne ze świądem, obrzękiem i pęcherzami.

Ostrzeżenia

- Nie należy stosować na uszkodzoną skórę, otwarte rany, wypryski.
- Należy zaprzestać stosowania leku, jeśli po jego użyciu pojawi się wysypka skórna.
- Należy unikać stosowania leku na duże powierzchnie skóry oraz przez okres dłuższy niż zatwierdzony okres stosowania, jeśli nie zostało to zalecone przez lekarza.
- Lek jest przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie należy go stosować w jamie ustnej.
- Po użyciu należy umyć ręce.
- Należy unikać kontaktu żelu z oczami. Jeżeli lek dostanie się do oczu, należy przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- W przypadku skręceń można zastosować jednoczesne bandażowanie, ale nie mogą to być bandaże nieprzepuszczające powietrza.

Producent

SYNOPTIS PHARMA