

Diclomax 25 mg, 10 tabletek



Cena: 10,35 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DICLOMAX
Opakowanie	10 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	VITABALANS OY
Przeznaczenie	Ból, Gorączka
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Diclomax to lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), zawierający 25 mg diklofenaku. Jest zalecany do stosowania przez dorosłych w celu objawowego leczenia ostrego bólu o łagodnym do umiarkowanego nasileniu.

Wskazania

Diclomax stosowany jest w objawowym leczeniu ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Działanie

Diclomax należy do grupy leków znanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Składniki

Substancją czynną leku jest 25 mg Diklofenaku potasowego.

Pozostałe składniki leku to Celuloza mikrokrystaliczna, Wapnia wodorofosforan dwuwodny, Skrobia żelowana kukurydziana, Kroskarmeloza sodowa, Krzemionka koloidalna bezwodna, Magnezu stearynian, Alkohol poliwinylowy, Makrogol, Talk, Tytanu dwutlenek (E 171), Żelaza tlenek czerwony (E 172), Żelaza tlenek żółty (E 172). Diclomax, 25 mg zawiera także Żelaza tlenek czarny (E 172).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Diclomax:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli u pacjenta występuje, lub występował, wrzód żołądka lub dwunastnicy
- jeśli u pacjenta występuje lub występowało krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacje związane z wcześniejszym stosowaniem leków przeciwbólowych (NLPZ)
- jeśli u pacjenta występuje zwiększona tendencja do krwawień
- jeśli pacjent ma poważne zaburzenia czynności wątroby

- jeśli u pacjenta występuje porfiria (choroba metaboliczna)
- jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca i (lub) chorobę naczyń mózgowych np. po przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru (przejściowego niedokrwienia mózgu) lub zatoru naczyń krwionośnych serca, lub mózgu, albo zabiegu udrożnienia, lub pomostowania zamkniętych naczyń
- jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych)
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży
- jeśli u pacjent uważa, że może być uczulony na diklofenak, kwas acetylosalicylowy, ibuprofen lub jakikolwiek inny lek z grupy NLPZ, albo na którykolwiek z pozostałych składników leku Diclomax. Do objawów nadwrażliwości zalicza się obrzęk twarzy i ust (obrzęk naczynioruchowy), trudności z oddychaniem, ból w klatce piersiowej, katar, wysypkę lub wszelkie inne reakcje o podłożu alergicznym.

Działania niepożądane

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Diclomax i powiadomić o tym lekarza w przypadku wystąpienia któregośkolwiek z poniższych działań niepożądanych:

- agranulocytoza (objawy: gorączka, ból gardła, bolesne owrzodzenia jamy ustnej, owrzodzenie odbytu, zmniejszona odpowiedź immunologiczną, skłonność do infekcji bakteryjnych)
- zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (choroby skórne zagrażające życiu, które powodują wysypkę, łuszczycę i owrzodzenie błon śluzowych)
- reakcje nadwrażliwości (zwięźnienie i niedrożność dróg oddechowych, pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny ze spadkiem ciśnienia)
- ból w klatce piersiowej, który może być objawem potencjalnie ciężkiej reakcji alergicznej zwanej zespołem Kounisa

Producent

VITABALANS OY