

Diclomax 25 mg, 20 tabletek powlekanych



Cena: 13,55 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DICLOMAX
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletka powlekana
Producent	VITABALANS OY
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Diclomax 25 mg to lek w formie tabletek powlekanych, zawierający diklofenak potasowy jako substancję czynną. Preparat należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i charakteryzuje się działaniem przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Tabletki mają linię podziału, co umożliwia ich podzielenie na dwie równe dawki w razie potrzeby.

Wskazania

Objawowe leczeniu ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, w tym:

- bólów mięśni i stawów,
- bólów reumatycznych,
- bólu zęba,
- bólu pleców i kręgosłupa,
- bolesnego miesiączkowania.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

Dorośli: 1 tabletka powlekana (25 mg) co 4 do 6 godzin.

Skład

1 tabletka powlekana zawiera:

- substancję czynną: diklofenak potasowy (Diclofenacum kalicum) 25 mg,
- pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, skrobia żelowana kukurydziana,

kraskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, alkohol poliwinylowy, makrogol, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172).

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Diclomax 25 mg (do objawów nadwrażliwości zalicza się obrzęk twarzy i ust (obrzęk naczynioruchowy), trudności z oddychaniem, ból w klatce piersiowej, katar, wysypkę lub wszelkie inne reakcje o podłożu alergicznym).
- Wrzód żołądka lub dwunastnicy (obecnie lub w przeszłości).
- Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacje związane z wcześniejszym stosowaniem leków przeciwbólowych (NLPZ) obecnie lub w przeszłości.
- Zwiększona tendencja do krwawień.
- Poważne zaburzenia czynności wątroby.
- Porfiria (choroba metaboliczna).
- Stwierdzona choroba serca i/lub choroba naczyń mózgowych np. po przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru (przejściowego niedokrwienia mózgu) lub zatoru naczyń krwionośnych serca, lub mózgu, albo zabiegu udrożnienia, lub pomostowania zamkniętych naczyń.
- Zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych) obecnie lub w przeszłości.
- Ciężka choroba nerek.
- Leku z dikofenakiem nie należy przyjmować w ostatnim trymestrze ciąży.
- Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Działania niepożądane

Często :

- ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, problemy trawienne, zmniejszenie apetytu, nadmiar gazów,
- ból głowy, zawroty głowy,
- wysypka,
- podwyższona wartość wskaźników wątrobowych.

Rzadko :

- egzema, rumień,
- reakcje nadwrażliwości (zwężenie i niedrożność dróg oddechowych, pokrzywka, szokowa reakcja alergiczna ze spadkiem ciśnienia tętniczego),
- zapalenie żołądka, krwawienie lub wrzody w drogach pokarmowych (może występować krew w kale lub wymiotach),
- zaburzenia czynności wątroby (w tym zapalenie wątroby z lub bez zażółcenie skóry),
- zmęczenie,
- astma (zadyszka, duszność),
- obrzęk ciała wskutek zatrzymania płynów.

Bardzo rzadko :

- pęcherze na skórze,
- redukcja ilości niektórych komórek krwi (czerwone krwinki, płytki krwi i neutrofile),
- gwałtowny obrzęk tkanek skórnych i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy),
- dezorientacja, depresja, bezsenność, koszmary senne, drażliwość, zaburzenia poczucia rzeczywistości,
- uczucie pieczenia lub kłucia skóry bez widocznych fizycznych skutków (parestezje), zaburzenia pamięci, drgawki, niepokój, niekontrolowane ruchy mięśni (drżenie), zaburzenia smaku, udar mózgu,
- zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, podwójne widzenie) i słuchu (redukcja słyszenia, szum w uszach),
- wpływ na serce i naczynia krwionośne (taki jak kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego), wysokie ciśnienie krwi, zapalenie naczyń, krwionośnych,
- zapalenie płuc,

Ostrzeżenia

- Pacjenci w podeszłym wieku narażeni są na podwyższone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych ze zwiększającym się wiekiem.
- Należy zaprzestać stosowania leku Diclomax jeśli wystąpi jakakolwiek wysypka skórna lub zmiany na błonach śluzowych i

skontaktować się z lekarzem.

- Podczas ospy wietrznej należy unikać stosowania tego leku.
- Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Diclomax i skonsultować się z lekarzem jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów (obrzęk naczynioruchowy): obrzęk twarzy, języka lub gardła, problemy z połykaniem, pokrzywka i problemy z oddychaniem.
- Przed otrzymaniem zastosowaniem leku Diclomax należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta niedawno przeprowadzono lub zaplanowano operację żołądka albo przewodu pokarmowego, ponieważ lek Diclomax czasami powoduje osłabienie procesu gojenia ran w jelitach po zabiegu chirurgicznym.
- Długotrwałe stosowanie różnych rodzajów leków przeciwbólowych w przypadku bólu głowy może powodować jego nasilenie. Jeśli taki przypadek miał miejsce lub istnieje podejrzenie, że może mieć miejsce, należy przerwać leczenie tym lekiem.
- Podobnie jak inne leki przeciwzapalne, Diclomax może maskować objawy i symptomy zakażenia.

Producent

Vitabalans Oy
Varastokatu 8
FI-13500 Hämeenlinna, Finlandia