

Diclostim, 0,74 mg/ml, roztwór do płukania jamy ustnej, gardła, 250 ml

Cena: 34,40 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	250 ml
Postać	Roztwór
Producent	SOLINEA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Diclostim to lek, którego głównym składnikiem aktywnym jest diklofenak – substancja wykazująca właściwości przeciwzapalne, przeciwozkrętkowe oraz łagodzące ból.

Wskazania

Lek Diclostim stosuje się w leczeniu objawowym stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła (np. objawów zapalenia dziąseł, zapalenia jamy ustnej, zapalenia gardła, w stanach po zabiegach stomatologicznych, objawów podrażnienia mechanicznego).

Działanie

Diclostim zawiera jako substancję czynną diklofenak, który jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ). Podczas stosowania miejscowego w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła diklofenak wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Dawkowanie

Zaleca się stosowanie roztworu do płukania jamy ustnej i gardła od 2 do 3 razy na dobę. Każdorazowo należy użyć 15 ml roztworu (1 miarkę) nierozcieńczonego lub rozcieńczonego niewielką ilością wody i płukać jamę ustną przez około 30-60 sekund. Po użyciu roztwór należy wypłuć.

Skład

- Substancją czynną leku jest diklofenak.
- Substancje pomocnicze: sorbitol (E 420); acesulfam potasowy (E 950); disodu edetynian; sodu benzoian (E 211); cholina chlorek; sodu wodorowęglan; disodu fosforan dwuwodny; glikol propylenowy (E 1520); lewomentol; glicerol; aromat czarnej porzeczki (glikol propylenowy E 1520, składniki poprawiające smak i zapach, naturalne składniki poprawiające smak i zapach, pulegon); aromat miętowy (glikol propylenowy E 1520, trioctan glicerolu E 1518, naturalne składniki poprawiające smak i zapach); aromat cytrynowy (etanol, woda, składniki poprawiające smak i zapach, naturalne składniki poprawiające smak i



zapach); czerwień koszenilowa (E 124); diwodorofosforan sodu dwuwodny; woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Diclostim: jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (diklofenak) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Glimbax; jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub na inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. po podaniu ibuprofenu, ketoprofenu, aspiryny wystąpił napad astmy, pokrzywka lub katar alergiczny); u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Ostrzeżenia

- Lek Diclostim zawiera sodu benzoesan, który powoduje podrażnienie błon śluzowych.
- Lek Diclostim zawiera czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne.
- Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

MEDICOFARMA S.A.
Tarnobrzeska 13
Radom