

Dicloctica 10 mg/g, żel, 100 g



Cena: 21,18 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	100 g
Postać	Żel
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 14 lat

Opis produktu

Opis

Dicloctica to żel zawierający diklofenak, który działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Ten lek dostępny bez recepty jest przeznaczony do miejscowego stosowania na skórę i jest odpowiedni dla dorosłych oraz młodzieży powyżej 14 roku życia.

Wskazania

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:

- pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwreżeń lub stłuczeń),

ból pleców,

- ograniczone stany zapalne tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.

Dorośli (powyżej 18 lat):

- ograniczone i łagodne postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

Działanie

Przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: nakładać cienkie warstwy żelu Dicloctica® na bolące miejsca 3 do 4 razy na dobę w zależności od potrzeby 2 g do 4 g leku co w przybliżeniu odpowiada 2,0-2,5 cm i jest wystarczające do posmarowania powierzchni około 400 cm² do 800 cm².

Skład

1 g żelu zawiera:

- substancja czynna: diklofenak sodowy 10 mg,
- pozostałe składniki: sodu wodorotlenek, hydroksyetyloceluloza, karbomer, glikol propylenowy, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Diclotica:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa (np. wysypka, trudności w oddychaniu lub napad kaszlu) po zastosowaniu leków

zawierających kwas acetylosalicylowy (stosowany również, jako lek przeciwzakrzepowy), ibuprofen, lub po innych lekach używanych w leczeniu bólu stawów i mięśni, gorączki i stanów zapalnych;

- w trzecim trymestrze ciąży;
- u dzieci poniżej 14 lat.

Działania niepożądane

- Bardzo rzadko: wysypka grudkowata, świąd, zaczerwienienie rumień lub wykwity skórne miejscowe lub ogólnoustrojowe, reakcje nadwrażliwości na światło, zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne.
- Często: wysypka skórna z pęcherzykami, pokrzywka, świąd, zaczerwienienie lub pieczenie skóry, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry).

Ostrzeżenia

- Diclotica zawiera propylu hydroksybenzoasan i metylu hydroksybenzoesan. Mogą one powodować reakcje alergiczne (reakcje typu późnego).
- Diclotica zawiera glikol propylenowy. Może on powodować podrażnienia skóry.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C.

Producent

TACTICA
Bankowa 4
Gliwice

Galeria

