


Dicopeg Endo Si, 60,98 g x 4 saszetki

Cena: 71,04 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DICOPEG
Opakowanie	4 saszetki po 60,98 g
Postać	Proszek
Producent	VITIS PHARMA
Przeznaczenie	Eliminacja gazów, Przeczyszczające, Wspomaganie pracy jelit
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Dicopeg Endo Si to proszek do sporządzania roztworu doustnego, zawierający makrogol i symetykon. Produkt ten jest przeznaczony do skutecznego oczyszczania jelit, co jest szczególnie ważne przed badaniami endoskopowymi, radiologicznymi i ultrasonograficznymi. Stosowanie tego wyrobu medycznego pomaga usunąć resztki z okrężnicy, co jest kluczowe dla dokładnego postawienia diagnozy.

Składniki

1 saszetka Dicopeg Endo Si zawiera:

- substancje czynne: makrogol 3350 60 g i symetykon 80 mg,
- substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sól sodowa sacharyny.

Zastosowanie

Oczyszczanie jelit w trakcie przygotowania do badań diagnostycznych, w tym endoskopowych, radiologicznych jelita grubego i ultrasonograficznych jamy brzusznej w celu postawienia dokładnego rozpoznania.

Sposób użycia

O ile lekarz nie zalecił inaczej, w celu doraźnego porządzenia roztworu, należy:

- Wsypać zawartość 2 saszetek do 1 l wody, mocno wstrząsnąć i wypić jednorodny roztwór w ciągu 1-2 godzin, przyjmując np. 250 ml roztworu co 10-15 minut;
- Wypić dodatkowe 500 ml (pół litra) wody, do łącznej objętości 1,5 l (1 l Dicopeg Endo SI i 500 ml wody);
- Po około 1 godzinie, powtórzyć przygotowanie kolejnych 2 saszetek i przyjąć drugi litr roztworu (i dodatkowe 500 ml wody), w ten sam sposób.

Przeciwwskazania



- Znana nadwrażliwość na makrogol lub inne składniki.
- Perforacja, niedrożność lub zwężenie jelit, niedrożność porażenna jelit.
- Poważne choroby zapalne przewodu pokarmowego, takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego i ostre rozdęcie okrężnicy.
- Stosowanie środków przeczyszczających jest przeciwwskazane w przypadku ostrych bólów brzucha nieznanego pochodzenia, nudności i wymiotów, krwawienia z odbytu nieznanego pochodzenia oraz w przypadku silnego odwodnienia.
- Nie stosować u pacjentów o wadze ciała poniżej 20 kg lub w wieku poniżej 2 lat.

Uwagi

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykietą.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Chronić od światła i wilgoci.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Produkt jest przeznaczony do jednorazowego użycia: nie używać saszetek częściowo lub saszetek otwartych w nieznanym czasie, ponieważ taki sposób użytkowania może prowadzić do ryzyka skażenia produktu.
- W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Producent

Dicofarm S.p.A.
Via del Casale della Marcigliana 29
00138 Rzym, Włochy