

Dicopeg Junior Free, od 6 miesiąca, 30 saszetek

Cena: 67,37 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	DICOPEG
Opakowanie	30 saszetek po 5 g
Postać	Proszek
Producent	VITIS PHARMA
Przeznaczenie	Przeczyszczające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dziecka, Od 6 miesiąca życia

Opis produktu

Opis

Dicopeg Junior Free to medyczny proszek przeznaczony do leczenia zaparć u dzieci od 6. miesiąca życia. Każda saszетка zawiera 5g makroglu 3350. Produkt, który można mieszać z wodą lub innymi płynami, jest szczególnie zalecany przy przewlekłych zaparciach oraz sporadycznych zaburzeniach pracy jelit. Dicopeg Junior Free działa osmotycznie, naturalnie regulując pracę jelit. Dzięki swoim właściwościom hydrofilowym zmiękcza stolec i ułatwia wypróżnienie, nie wywołując skurczów, bólów brzucha ani nagłego parcia. Skuteczność produktu pozostaje stała w czasie. Preparat nie jest wchłaniany ani fermentowany w jelitach i nie podrażnia błony śluzowej, będąc wydalany z kałem w niezmienionej formie.

Dawkowanie

- Dzieci od 6. miesiąca życia do 2 lat (do 12kg): 1-2 saszetki dziennie,
- Dzieci od 2. do 11. roku życia (12-20kg): 2-4 saszetki dziennie,
- Dzieci powyżej 11. roku życia (>20kg): 2-6 saszetek dziennie.

Składniki

1 saszетка (5g) zawiera:

- makrogl 3350 5g.

Zastosowanie

Leczenie przewlekłych zaparć oraz sporadycznych zaburzeń pracy jelit u dzieci od 6. miesiąca życia.

Przeciwwskazania

- Stwierdzona nadwrażliwość na makrogl.
- Perforacja i/lub niedrożność układu pokarmowego.



- Zmiany chorobowe układu pokarmowego lub wydalniczego.
- Poważne chorób zapalnych jelit, w tym choroba Leśniewskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostre rozdęcie okrężnicy.

Ważne wskazówki

- Stosowanie wyrobu medycznego Dicopeg Junior Free u małych dzieci należy zawsze skonsultować z lekarzem.
- Nie stwierdzono interakcji preparatu z innymi lekami, jednak zaleca się zażywanie Dicopeg Junior Free w odstępie co najmniej 2 godzin od zażycia innych leków doustnych, gdyż działanie osmotyczne makrogolu oraz przyspieszenie pasażu jelitowego mogą zmniejszyć ich skuteczność.
- W trakcie leczenia innymi lekami zaleca się skonsultowanie z lekarzem przed rozpoczęciem zażywania Dicopeg Junior Free.
- Produkt należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla dzieci.
- Preparat należy zużyć w ciągu 2 miesięcy od pierwszego otwarcia.

Producent

SIIT
Via Ariosto 50/60
Trezzano sul Naviglio - Milano, Włochy