


# Diges-tonik 100 g



Cena: 14,20 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	100 ml (but.)
Postać	Płyn
Producent	KRAKOWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" W KRAKOWIE S.A.
Przeznaczenie	Niestrawność, Trawienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

Płyn doustny **Digestonic** to lek tradycyjnie stosowany w przypadku niestrawności. Zawiera on związki antranoidowe. Ten produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

### Działanie

Preparat pobudza wydzielanie soków trawiennych, działa wiatropędnie, rozkurczająco i żółciopędnie.

### Dawkowanie

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania: doustnie 1 łyżeczka (5ml) preparatu w 1/4 szklanki wody. Stosować 3 razy dziennie.

### Skład

1ml płynu doustnego zawiera: 1ml płynnego wyciągu z Hypericiherba (ziela dziurawca) - 5,70cz., Chamomillae flore (kwiat rumianku) - 2,84cz., Menthae piperitae folio (liść mięty pieprzowej) - 2,84cz., Rhei radice (korzeń rzwienia) - 2,86cz., Rosae fructu (owoc róży) - 2,84cz., Foeniculi fructu (owoc kopru włoskiego) - 1,46cz., Coriandri fructu (owoc kolendry) - 1,46cz. (1:5). 1ml produktu zawiera 0,31 - 0,45mg związków antranoidowych w przeliczeniu na reinę. Ekstrahent - etanol 70% (V/V). Zawartość etanolu 60,0 - 68,0% (V/V).

### Przeciwwskazania

Nie stosować leku u osób z niedrożnością i stanami zapalnymi jelit, a także kamicą żółciową. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest nadwrażliwość na składniki produktu leczniczego jak również choroby, w których nie jest wskazane przyjmowanie etanolu (np. padaczka, choroba alkoholowa, choroby wątroby).

### Ostrzeżenia

- Lek zawiera 60-68 % etanolu, jednorazowa dawka produktu (5 ml płynu) zawiera do 2,7 g alkoholu, co odpowiada 68 ml piwa lub 28 ml wina.
- Szkodliwy dla osób cierpiących na alkoholizm.



- Nie zaleca się stosowania produktu u osób cierpiących na padaczkę czy choroby wątroby.

**Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.