

Diohespan max, 1000 mg, proszek doustny, 30 saszetek

Cena: 35,84 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 saszetek
Postać	Proszek
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwwysiękowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Diohespan Max w proszku to lek, który wzmacnia napięcie naczyń żylnych i chroni je przed uszkodzeniami. Stosowany jest w przypadku żylaków, uczucia ciężkich nóg, nocnych skurczów mięśni oraz nasilonych objawów hemoroidów. Proszek Diohespan Max można przyjmować bezpośrednio na język, nie wymagając popijania.

Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku są objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych, jak bóle i nocne kurcze nóg; uczucie ciężkości nóg; żylaki kończyn dolnych; obrzęki nóg (opuchlizna/puchnięcie nóg); poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajęczki naczyniowe. Diohespan Max podaje się również w objawowym leczeniu żylaków odbytu (hemoroidów).

Działanie

Diohespan max działa na mikrokążenie, powodując mniejszą przepuszczalność małych naczyń krwionośnych i zastój w mikrokążeniu oraz okołonaczyniowe stany zapalne. Diohespan max również zmniejsza podatność małych naczyń krwionośnych na pęknięcie.

Dawkowanie

Zwykle stosowane dawkowanie Diohespanu Max to 1 saszетка na dobę.

Skład

- Substancją czynną leku jest diosmina.
- Jedna saszетка zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy.
- Substancje pomocnicze: sacharoza, alkohol poliwinylowy, polisorbit 80, glukoza, kwas cytrynowy, guma ksantan, krzemionka koloidalna bezwodna, aromat pomarańczowySD1918 (w tym: fruktoza), aromat wiśniowySD0559 (w tym: alkohol benzylowy), sukraloza.

Przeciwwskazania

Nie stosować Diohespanu Max u pacjentów uczulonych na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku.



Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób na 10 000): biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie, wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze), pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze), świąd.

Ostrzeżenia

- Jeżeli dolegliwości związane z żylakami odbytu utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem. Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe.
- Jeśli po upływie 7dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice