

Diosmina Colfarm Max, 1000 mg, tabletki, 60 tabletek

Cena: 69,61 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	ZAKŁ. FARM. COLFARM S.A.
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Diosmina Colfarm Max to lek zawierający zmikronizowaną diosminę, stosowany w łagodzeniu objawów takich jak uczucie ciężkości, ból nóg oraz nocne skurcze. Ponadto, diosmina wzmacnia naczynia krwionośne, zmniejszając ich podatność na pęknięcie.

Wskazania

Diosminę Colfarm Max stosuje się do leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego i limfatycznego kończyn dolnych. Objawami tymi mogą być: uczucie ciężkich nóg, ból nóg, nocne kurcze nóg, pajęczki naczyniowe. Lek stosuje się również w leczeniu objawowym zaostrzeń symptomów związanych z żylakami odbytu.

Działanie

Diosmina działa ochronnie na naczynia żyłne oraz poprawia ich napięcie. Zwiększa przepływ limfy przez naczynia limfatyczne. Zmniejsza przepuszczalność ścian małych naczyń krwionośnych, zwiększa ich odporność na pęknięcie. Dzięki temu zmniejsza się zastój w mikrokrążeniu.

Dawkowanie

Jeśli dolegliwości od żylaków odbytu uległyby zaostrzeniu można przyjmować 1 tabletkę 3 razy dziennie przez 4 dni, a następnie 1 tabletkę 2 razy dziennie przez kolejne 3 dni. Nie stosować wyższych dawek.

Skład

- Substancją czynną jest diosmina (Diosminum).
- 1 tabletkę zawiera 1000 mg diosminy,
- Substancje pomocnicze: alkohol poliwinylowy, kroscarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Leku nie powinno się stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki leku (diosminę lub substancje pomocnicze).



Działania niepożądane

W trakcie stosowania leku rzadko występowały takie objawy jak: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie, wysypka, świąd, pokrzywka.

Ostrzeżenia

Działanie diosminy w zaburzeniach krążenia żylnego nóg można zwiększyć poprzez odpowiednie postępowanie.

Należy unikać nadmiernej ekspozycji na słońce oraz przebywania przez dłuższy czas w pozycji stojącej.

Terapię można również wspomóc poprzez zachowanie odpowiedniej wagi ciała oraz noszenie pończoch uciskowych (kompresjoterapia).

W przypadku leczenia nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że działanie leku jest objawowe. Gdyby dolegliwości nie mijały, należy skonsultować się z lekarzem.

Producent

COLFARM

Wojska Polskiego 3

Mielec