

Diosminex Max 1000 mg, 30 tabletek powlekanych



Cena: 39,96 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DIOSMINEX MAX
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Przeznaczenie	Hemoroidy, Obrzęk, Żylaki
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Diosminex Max 1000 mg dostępny bez recepty lek w postaci tabletek doustnych. Jest przeznaczony dla osób dorosłych i służy do łagodzenia skutków związanych z przewlekłą ciążą żylną, elektryczną, jak przyjaciele ciężkości nóg, nocne kurcze i bóle nóg. Lek jest również stosowany w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Tabletka zawiera aktywną substancję - zmikronizowaną diosminę w zawartości 1000 mg. Działa poprzez szkodliwe działanie ścieków żylnych oraz zapewnia ochronę dla ścieków.

Wskazania

Dla osób dorosłych do:

- leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego takich jak: uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze nóg;
- objawowego leczenia w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu.

Działanie

Lek zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia.

Dawkowanie

- Przewlekła niewydolność żylna (leczenie objawowe): 1 tabletka raz na dobę. Lek należy przyjmować co najmniej kilka tygodni.
- Dolegliwości związane z żylakami odbytu (hemoroidy; leczenie zaostrzenia): 3 tabletki na dobę przez pierwsze 4 dni, kolejno 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni.

Skład

1 tabletka zawiera 1000 mg diosminy.

Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna

bezwodna, magnezu stearynian; otoczka: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, lak żółcieni chinolinowej (E 104), lak indygotyny (E 132), lak żółcieni pomarańczowej (E 110), żelaza tlenek czarny (E 172).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Diosminex Max:

- w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- biegunka, niestrawność, nudności, wymioty,
- zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie,
- wysypka, świąd, pokrzywka.

Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta lekach obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ostrzeżenia

- W przypadku łagodnych działań niepożądanych, dotyczących żołądka i jelit, oraz zaburzeń neurovegetatywnych (np. wzmożony niepokój, przyspieszone bicie serca, nadmierna potliwość, lęklivość) nie jest wymagane odstawienie leku.
- W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że terapia lekiem Diosminex Max jest tylko objawowa i powinna być krótkotrwała. Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy przeprowadzić badanie u lekarza proktologa, który wybierze odpowiednią metodę leczenia.
- Przyjmowanie tego leku w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu nie wyklucza jednoczesnego stosowania doodbytniczo innych leków.
- W przypadku zaburzeń krążenia żylnego w nogach, działanie terapeutyczne leku Diosminex Max można zwiększyć poprzez odpowiedni tryb życia: unikanie ekspozycji słonecznej, unikanie przebywania w pozycji stojącej przez dłuższy czas, utrzymanie odpowiedniej wagi ciała, noszenie specjalnych pończoch.
- Jeżeli objawy choroby ulegają pogorszeniu tzn. obserwuje się stan zapalny skóry, stan zapalny żył, stwardnienie tkanki podskórnej, silny ból, owrzodzenia skóry lub gdy występują objawy nietypowe na przykład natychmiastowy obrzęk jednej lub obydwu nóg, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.