

Dip Rilif, (50 mg+30 mg)/g, żel, 50 g

Cena: 29,32 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 g
Postać	Żel
Producent	COLEP LAUPHEIM GMBH & CO. KG
Przeznaczenie	Chłodzące, Przeciwbólowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Dip Rilif to lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i łagodzącym obrzęki, stosowany w przypadku bólu różnego pochodzenia, takiego jak bóle reumatyczne, mięśniowe czy pleców, którym towarzyszy obrzęk.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania żelu DIP RILIF jest miejscowe leczenie przeciwbólowe i przeciwzapalne w:

- bólach reumatycznych (w tym bólach stawów spowodowanych zmianami zwyrodnieniowymi i zapalnymi), bólach pleców, bólach mięśniowych;
- bólu i obrzęku wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzjach sportowych;
- bólach w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach;
- lumbago (postrzałe)

Działanie

DIP RILIF dzięki zawartości dwóch substancji czynnych – ibuprofenu i mentolu – posiada skojarzone działanie. Ibuprofen, z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NPLZ), miejscowo stosowany powoduje efekt przeciwbólowy oraz przeciwzapalny. Mentol oddziałuje na zakończenia nerwowe skóry, łagodząc dolegliwości bólowe ścięgien, mięśni czy stawów. DIP RILIF bardzo szybko po naniesieniu na skórę łagodzi ból.

Dawkowanie

Zwykle stosowane dawkowanie dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat to cienka warstwa żelu delikatnie wmasowana do wchłonięcia na bolesne miejsce do 3 razy na dobę, ale nie częściej niż co 4-godziny.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są ibuprofen (Ibuprofenum) i mentol (Mentolum).

- 1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu.
- Substancje pomocnicze: karbomer, glikol propylenowy, etanol 96%, diizopropanolamina, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do zastosowania DIP RILIF jest wystąpienie kiedykolwiek reakcji uczuleniowej na ibuprofen lub mentol, czy na którykolwiek z pozostałych składników tego leku, kwas acetylosalicylowy, lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Nie podawać leku astmatykom, u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, nieżyt błony śluzowej nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Nie stosować żelu na błony śluzowe, wargi, noszdrza i okolice narządów moczowo-płciowych, do oczu i na skórę w okolicach oczu jak również na skórę uszkodzoną lub zmienioną zapalnie.

Działania niepożądane

Do najczęściej spotykanych działań niepożądanych należą reakcje miejscowe: zaczerwienienie, świąd, pieczenie, wysypka, pokrzywka i oparzenia w miejscu stosowania. Radziej występują zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: bóle brzucha i niestrawność. U osób predysponowanych, u których występują lub występowały napady astmatyczne lub choroby alergiczne, mogą wystąpić napady duszności.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku pacjentów z: alergią na kosmetyki lub leki, chorobą nerek albo wrzodową, stosujących kwas acetylosalicylowy czy inne leki.
- Dip Rilif zawiera 250 mg glikolu propylenowego w każdym 2,5 g żelu, co odpowiada 100 mg/g. Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące

Producent

THE MENTHOLATUM

Galeria

