

DobenoX 30 tabletek



Cena: 12,27 zł

Opis słownikowy

| | |
|-----------------|--|
| Dla kogo | Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Marka | DOBENOX |
| Opakowanie | 30 tabletek |
| Postać | Tabletka |
| Producent | PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. |
| Przeznaczenie | Hemoroidy, Obrzęk, Zakrzepy, Żylaki |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty |
| Wiek | Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat |

Opis produktu

Opis

DobenoX to lek stosowany w celu usprawnienia przepływu żylnego. Lek zwiększa elastyczność ścian naczyń krwionośnych oraz zmniejsza lepkość osocza.

Wskazania

Objawowe leczenie przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (ból i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastój krwi), żylaki kończyn dolnych. Objawowe leczenie żylaków odbytu.

Działanie

Wapnia dobezylan jednowodny, który usprawnia krążenie żylnie i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Zmniejsza przepuszczalność ich ścian oraz nadmierną lepkość krwi i osocza, co zapobiega powstawaniu zastojów i zakrzepów w naczyniach żylnych.

Dawkowanie

- Niewydolność żylna - 2 tabletki 1-2 razy na dobę,
- Żylaki odbytu - 2 tabletki 1-2 razy na dobę.

Skład

Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan jednowodny, 1 tabletka zawiera 250mg wapnia dobezylanu jednowodnego, pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka Opadry II 57U18539 White o składzie: hypromeloza, polidekstroza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, maltodekstryna, średniołańcuchowe trójglicerydy.

Przeciwwskazania

Nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na wapnia dobezylan jednowodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.



Działania niepożądane

- nudności, biegunka,
- odczyny skórne,
- bóle stawów.

Ostrzeżenia

- Należy ostrożnie stosować lek, jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka lub niewydolność nerek.
- Lek zawiera laktozę.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.